

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**АЛЬБУЦИД**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Альбуцид

**Международное непатентованное название:** Сульфацетамид натрия (Sulfacetamide sodium)

**Основные синонимы:** Сульфацил натрия, Альбуцид–натрий, Сульфацетамид.

**Лекарственная форма:** Порошок для наружного применения в пакетиках.

**Описание:** Белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок. Легко растворим в воде, мало растворимый в этаноле.

**Состав:** каждый пакетик содержит: *активное вещество* – 0,3 г или 0,5 г сульфацетамид натрия; *вспомогательные вещества* отсутствуют.

**Фармакотерапевтическая группа:** Противомикробное средство, сульфаниламид.

**Код АТХ:** S01AB04

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Антибактериальное средство для местного применения, производное сульфаниламида. Обладает широким спектром противомикробного действия. Оказывает бактериостатическое действие путем ингибирования бактериального синтеза дигидрофолиевой кислоты. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с пара-аминобензойной кислотой и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia spp.*, *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

**Фармакокинетика**

При местном применении возможно отсутствие всасывания или незначительное всасывание в системный кровоток через воспаленную кожу. Степень всасывания зависит также от размеров пораженных участков кожи.

## **Показания к применению**

Инфицированные раны различной этиологии.

## **Способ применения и режим дозирования**

Препарат применяется наружно путем припудривания порошком пораженных участков кожи с помощью марлевой салфетки.

Количество наносимого препарата зависит от размеров очага поражения - от 1 до 5-и пакетика.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к сульфацетамиду и другим сульфаниламидным препаратам.

## **Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно лишь в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и младенца.

## **Побочные действия**

При наружном применении в отдельных случаях возможно раздражение тканей в виде покраснения, зуда.

## **Особые указания и меры предосторожности**

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, производным сульфонилмочевины или ингибиторам карбоангидразы, могут иметь повышенную чувствительность к Альбуциду.

При назначении препарата детям рекомендуется учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного препарата.

При длительном применении возможно развитие бактериальной устойчивости, а также увеличение невосприимчивых к препарату микроорганизмов, включая грибки. При первых симптомах гиперчувствительности применение препарата следует прекратить.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При одновременном применении каких-либо других лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.

При одновременном применении с новокаином, дикаином, анестезином бактериостатический эффект Альбуцида уменьшается. Наблюдается несовместимость Альбуцида при его одновременном применении с солями серебра.

## **Упаковка**

10 пакетиков по 0,3 г или 0,5 г в полиэтиленовой упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить недоступном для детей месте при температуре 15-25 °С.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

**Срок годности – 2 года.**

**Условия отпуска из аптек – Отпускается без рецепта врача.**

## **Производитель**

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673929; E-mail: escopharm@yahoo.com