

# РОВАТИНЕКС®

Капсулы ГАСТРОРЕЗИСТЕНТНЫЕ, МЯГКИЕ

**Активные вещества:** α-пинен, β-пинен, камфен, борнеол, анетол, фенхон, цинеол

**Внимательно прочитайте данный листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам придется прочитать его еще раз.
- Проконсультируйтесь с Вашим фармацевтом, если Вам нужна дополнительная информация или совет.
- Если Ваши симптомы усиливаются, или если Вы не чувствуете облегчения, обратитесь к врачу.
- Если выраженность какого-либо побочного эффекта усиливается, или если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данном вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту.

## Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Роватинекс® и для чего он применяется
2. Перед применением препарата Роватинекс®
3. Как принимать Роватинекс®
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Роватинекс®
6. Дополнительная информация

**1. Что такое Роватинекс® и для чего он применяется**  
Роватинекс® способствует размельчению и выведению почечных камней и камней мочевыводящего тракта. Роватинекс® снимает мышечные спазмы, тем самым уменьшая боль при почечных и мочеточниковых коликах. Роватинекс® увеличивает приток крови и уменьшает воспаление, которое может быть связано с наличием камней в почках.

**2. Перед применением препарата Роватинекс®**  
Не принимайте Роватинекс®, если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на любое из активных веществ: (α-пинен, β-пинен, камфен, борнеол, анетол, фенхон, цинеол) или любые другие ингредиенты препарата Роватинекс® (подробнее см. раздел 2 «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата Роватинекс®» и раздел 6 «Дополнительная информация»).

## Соблюдайте особую осторожность при применении препарата Роватинекс®

Сообщите своему врачу, если принимаете лекарства, разжижающие кровь или лекарства, разрушающиеся в печени.

## Применение других лекарственных средств

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если принимаете или недавно принимали любые другие лекарства, в том числе безрецептурные. К этим средствам относятся:

- препараты, разжижающие кровь (пероральные антикоагулянты, например, варфарин)
- препараты, разрушающиеся в печени (обратитесь к своему врачу за консультацией по этому вопросу).

## Беременность и кормление грудью

Обратитесь к своему врачу или фармацевту за советом, прежде чем принимать любое лекарство. Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, то должны принимать Роватинекс® только по совету своего врача.

## Влияние на способность управления автотранспортом и другими механизмами

Влияние Роватинекса® на способность управления автотранспортом и другими механизмами маловероятно.

## Важная информация о некоторых ингредиентах препарата Роватинекс®

Следующие ингредиенты препарата Роватинекс® могут вызвать аллергические реакции: натрия этилпарагидроксibenзоат (E215), натрия пропилпарагидроксibenзоат (E217) (возможно, замедленного типа) и солнечный закат желтый FCF 85% (E110).

## 3. Как принимать Роватинекс®

Всегда принимайте Роватинекс® в соответствии с указаниями своего врача. Вам следует проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом, если Вы не уверены как принимать препарат. Капсулы Роватинекс® следует заглатывать целиком, не прожевывая.

## Обычная доза для взрослых:

Принимать по 1-2 капсуле 4-5 раз в сутки до еды.

## Обычная доза для детей в возрасте от 6 до 14 лет:

Принимать по 1 капсуле два раза в сутки до еды.

## Если Вы превысили допустимую дозу препарата Роватинекс®

Если Вы приняли больше капсул, чем следует, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

## Если вы забыли принять Роватинекс®

Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной дозы. Просто примите препарат, как только вспомните. После этого примите следующую дозу в обычное время.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию данного препарата, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

## 4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, Роватинекс® может вызвать побочные эффекты. Если вы заметите какие-либо побочные эффекты, пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

## 5. Как хранить Роватинекс®

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 25°C. Не использовать Роватинекс® по истечении срока годности, указанного на блистере и на внешней картонной коробке. Срок годности относится к последнему дню данного месяца. Лекарственные средства не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Спросите у своего фармацевта, как избавиться от лекарства, которое больше не нужно. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

## 6. Дополнительная информация

**Что содержит Роватинекс®**  
Активные вещества, содержащиеся в одной мягкой гастроинтестинальной капсуле: α-пинен 24.8мг, β-пинен 6.2мг, камфен 15.0мг, борнеол 10.0мг, анетол 4.0мг, фенхон 4.0мг, цинеол 3.0мг.

Вспомогательные вещества: натуральное оливковое масло.

Оболочка капсулы содержит:

- желатин
- глицерин 85%
- натрия этилпарагидроксibenзоат (E215)
- натрия пропилпарагидроксibenзоат (E217)
- солнечный закат желтый FCF 85% (E110)
- хинолин желтый 70% (E104).

## Как выглядит Роватинекс®, и что содержит упаковка

**Роватинекс®** - шарообразные (сферические) мягкие желатиновые гастроинтестинальные капсулы желтого цвета. Содержимое капсул: жидкость от бледно-желтого до зеленовато-желтого цвета, с сильным ароматическим запахом.

10 капсул в блистере. 10 блистеров по 10 капсул в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

## Условия отпуска из аптек

По рецепту.

## Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Рова Фармасьютикалз Лтд, Ньютаун, Бантри, графство Корк, Ирландия. Тел.: +35327500777.  
Эл.-почта: rowa@rowa-pharma.ie

Листок-вкладыш в последний раз был утверждён в феврале 2013г.