

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
(аннотация-вкладыш)

**БИСАКОДИЛ**

*Bisacodyl*

**Международное непатентованное название (МНН)** - Bisacodyl;

**Описание лекарственной формы:** суппозитории цилиндрической формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. На продольном срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

**Состав лекарственной формы**

Один суппозиторий содержит:

*активное вещество:* бисакодил 10 мг;

*вспомогательные вещества:* твердый жир.

**Форма выпуска** суппозитории ректальные.

**Фармакотерапевтическая группа** Слабительные препараты. Контактные слабительные препараты.

**Код АТС:** А06АВ02.

**Фармакологические свойства**

Бисакодил - производное дифенилметана. Оказывает слабительное, ветрогонное действие.

*Фармакодинамика* Механизм действия обусловлен прямой стимуляцией нервных окончаний слизистой оболочки толстой кишки, повышая продукцию слизи в толстой кишке, что приводит к размягчению кала, улучшению его скольжения, способствуя акту дефекации, а также ускорением и усилением перистальтики кишечника.

*Фармакокинетика* Бисакодил не абсорбируется из толстого кишечника и не проникает в грудное молоко. При ректальном введении выраженный слабительный эффект наступает в течение часа (15-60 минут).

**Показания** Запор, обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов; запоры после операций, родов, смены диеты). Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах. Подготовка толстого кишечника к хирургическим вмешательствам, рентгенологическим и инструментальным исследованиям.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, спастический запор; ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, боли в животе неясного генеза, перитонит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, маточные кровотечения, цистит, острый проктит, острый геморрой).

### **Особенности применения**

Не применять препарат в течение длительного времени.

С осторожностью назначают бисакодил пациентам с печеночной и/или почечной недостаточностью.

Во время применения препарата следует употреблять большое количество жидкости с целью обеспечения нормальной консистенции каловых масс.

Если при применении бисакодила начнется кровотечение из прямой кишки, прием препарата следует прекратить.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Учитывая, что бисакодил не всасывается из кишечника, взаимодействие с другими препаратами маловероятно.

### **Беременность и лактация**

Следует соблюдать осторожность при применении препарата в период беременности или лактации.

### **Влияние на способность к вождению и управлению механизмами**

Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами.

### **Способ применения и дозы**

Ректально. Взрослым и детям старше 14 лет - 10 — 20 мг бисакодила (1-2 суппозитория) в сутки; детям в возрасте 8 - 14 лет - по 10 мг (1 суппозиторий) в сутки, 2 - 7 лет - по 5 мг (1/2 суппозитория) в сутки. При подготовке к оперативному вмешательству или к диагностическим исследованиям вечером и утром по 10 мг (1 суппозиторий).

### **Передозировка**

*Симптомы:* диарея, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки. *Лечение:* симптоматическое.

### **Побочные действия и реакции**

Кишечная колика; диарея, которая может привести к дегидратации, нарушению водно-электролитного обмена, развитию мышечной слабости, судорог, артериальной гипотонии; аллергические реакции.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускать без рецепта врача.

**Упаковка**

Суппозитории ректальные по 10 мг. По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки. По 2 контурные ячейковые упаковки № 5 вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Производитель**

ООО "ФАРМАПРИМ"

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

[www.farmaprim.md](http://www.farmaprim.md)