

1.3.1	Ginkgo leaf dry extract
SPC, Labeling and Package Leaflet	

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению препарата  
**БИЛОБИЛ®**

**Торговое название**  
**БИЛОБИЛ® (BILOBIL®)**

**Международное название**  
гинкго билоба (ginkgo biloba)

**Лекарственная форма**  
Капсулы

**Состав**

1 капсула содержит в качестве действующего вещества:  
Сухой экстракт листьев гинкго билоба – 40 мг, стандартизованный до содержания 9,6 мг флавоновых гликозидов гинкго и 2,4 мг терпеновых лактонов (гинкголиды и билобалиды) в 40 мг.

*Вспомогательные вещества:* моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, тальк, безводная коллоидная двуокись кремния, стеарат магния.

*Оболочка капсулы:* желатин, индиготин (E132), азорубин (E122), окись железа красная (E172), окись железа черная (Е 172), двуокись титана (Е 171).

**Описание**

Капсулы шоколадно-коричневого цвета. В капсулах содержится порошок желтовато-коричневого цвета с видимыми частицами более темного цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Периферический вазодилататор (сосудорасширяющее средство). Код ATХ [C04AX].

**Фармакологические свойства**

Капсулы Билобил содержат биологически активные вещества экстракта листьев гинкго билоба (флавоновые гликозиды, терпеновые лактоны), которые способствуют укреплению и повышению эластичности сосудистой стенки, улучшают реологические свойства крови. Экстракт гинкго билоба нормализует обмен веществ в клетках, препятствует агрегации эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует кровенаполнение сосудов. Вследствие этого улучшается микроциркуляция, снабжение мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой.

**Показания к применению**

Билобил показан при нарушениях мозгового кровообращения, проявляющихся

- нарушением внимания и/или памяти, снижением интеллектуальных способностей;
- чувством тревоги, страха;
- головокружением, шумом в ушах;

1.3.1	Ginkgo leaf dry extract
SPC, Labeling and Package Leaflet	

- головной болью, нарушением сна.

Препарат также показан при нарушении периферического кровообращения и микроциркуляции в конечностях.

#### **Способ применения и дозы**

Препарат назначается внутрь по 1 капсуле 3 раза в день. Капсулы следует проглатывать, запивая небольшим количеством жидкости. Курс лечения не менее 3-х месяцев. Первые признаки улучшения обычно появляются через 1 месяц. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

#### **Побочные действия**

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), нарушения функции желудочно-кишечного тракта (диспепсия), головная боль.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст.

#### **Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Билобил не сообщалось.

#### **Особые указания**

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Возможен прием капсул Билобила вместе с пищей и напитками.

Не рекомендуется принимать капсулы Билобила вместе с алкогольными напитками.

#### *Беременность и грудное вскармливание*

Билобил не рекомендуется назначать во время беременности и грудного вскармливания.

#### *Влияние на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами*

Не выявлено влияния препарата на способность управлять автомобилем или работать с потенциально опасными механизмами.

Препарат содержит лактозу 66 мг, в случае непереносимости сахаров необходимо посоветоваться с врачом.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется применение препарата Билобил пациентам, постоянно принимающим ацетилсалicyловую кислоту или антикоагулянты. Совместное применение с указанными препаратами может увеличить риск кровотечения из-за возможного удлинения времени свертываемости крови.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

1.3.1	Ginkgo leaf dry extract
SPC, Labeling and Package Leaflet	

**Условия отпуска из аптек**  
Без рецепта врача.

**Упаковка**

Капсулы 40 мг, по 10 капсул в блистер. 20 или 60 капсул (2 или 6 блистеров) в картонной пачке.

**Производитель**

КРКА, д.д. Ново место,  
Шмарешка цеста, 6, 8501 Ново место, Словения.