

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Облепиховое масло

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:

Один суппозиторий содержит:

активное вещество: облепихи крушиновидной плодов масло (облепихового масла концентрат) – 0,5 г (облепихового масла концентрат предварительно разбавляют маслом подсолнечным до содержания суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин 240 мг %);

вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол (бутилоксианизол) – 0,00025 г, бутилгидрокситолуол (дибунол) – 0,00025 г; основа для суппозиториев: жир твердый (витепсол, суппосир) - достаточное количество до получения суппозитория массой 2,00 г, глицерила моностеарат (моностеарата глицерин) - до 5 % к массе основы для суппозиториев.

Описание:

Суппозитории от оранжевого до темно-оранжевого цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа:

Геморроя средство лечения растительного происхождения

Код АТХ C05AX.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Облепиховое масло стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие. Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).

Показания к применению

Геморрой, трещины заднего прохода, язвы прямой кишки, проктит, эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит, катаральный и атрофический проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстого кишечника.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, диарея.



Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы

Ректально, после опорожнения кишечника вводят глубоко в задний проход.

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение 10-15 дней. Детям до 6 лет – 1 суппозиторий 1 раз в день; 6-14 лет - 1 суппозиторий 1-2 раза в день. Курс лечения - 14 дней и более. При необходимости через 4-6 недель курс лечения повторяют.

Побочное действие

Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные отсутствуют.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 0,5 г. По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте, при температуре от 5 °С до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год 6 мес. Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель/ Организация, принимающая претензии

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>



КОПИЯ ВЕРНА

ЛОГИНОВА ЕМ