

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению препарата**

### **БИСАКОДИЛ-НИЖФАРМ**

**Регистрационный номер** P N001895/01

**Торговое название препарата** Бисакодил-Нижфарм

**Международное непатентованное название** Бисакодил

**Лекарственная форма** суппозитории ректальные

#### **Состав**

Один суппозиторий содержит: *активное вещество*: бисакодил – 10 мг, *основа для суппозитория*: твердый жир (витепсол, суппосир) – достаточное количество для получения суппозитория массой 1,25 г.

**Описание** Суппозитории от белого до белого со слегка желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

**Фармакотерапевтическая группа** слабительное средство

**Код АТХ:** А06АВ02

#### **Фармакологические свойства**

Вызывает раздражение рецепторного аппарата кишки, оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.

Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Действие наступает в течение первого часа.

#### **Показания к применению**

Гипотонические и атонические запоры (в т.ч. запоры у пожилых; запоры после операций и родов). Регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода). Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, спастические запоры, острый проктит, острый геморрой, детский возраст до 8 лет.

#### **С осторожностью**

Печеночная и/или почечная недостаточность.

#### **Применение при беременности и лактации**

С осторожностью возможно применения в период беременности и лактации.

**Способ применения и дозы**

Ректально, назначают в следующих дозах: взрослым и детям старше 14 лет - 10-20 мг бисакодила (1-2 свечи), детям 8-14 лет - 10 мг бисакодила (1 свеча).

**Побочное действие**

Кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение артериального давления), боль в животе, метеоризм, аллергические реакции.

**Передозировка**

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

**Особые указания**

Не применять в течение длительного времени.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 10 мг, по 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25<sup>0</sup>С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель****ОАО «Нижфарм», Россия**

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, г. Н.Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278 80 88

Факс: (831) 430 72 28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>