

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

Витасилк®

5% гель для наружного применения

Бензоил пероксид

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать применять данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас

Следует всегда применять данный препарат в точности так, как описано в этом листке-вкладыше или рекомендовано Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться за советом к лечащему врачу или фармацевту.
- Если у Вас появились любые другие побочные эффекты, следует сообщить об этом лечащему врачу или фармацевту. Это включает любые возможные побочные эффекты не перечисленные в этом листке-вкладыше (см. раздел 4).
- Если эффект препарата выражен слабо или наоборот, Вы чувствуете ухудшение состояния, необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Витасилк и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед применением Витасилка
3. Как применять Витасилк
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Витасилк
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

1. Что такое Витасилк и для чего он применяется

- Витасилк содержит активное вещество бензоил пероксид, который проявляет противомикробную активность в отношении *Propionibacterium acnes*, который является одним из наиболее часто встречающимся возбудителем угрей (акне).
- Ваш лечащий врач или фармацевт могут порекомендовать данный лекарственный препарат для лечения угрей (акне). Акне проявляется в виде обыкновенных и белых угрей (милиумы), которые люди часто называют прыщами или пятнами.

- Препарат предназначен для лечения угревой сыпи в области лица, грудной клетки или спины.

2. Что необходимо знать перед применением Витасилка

Не применять Витасилк, если у Вас:

Аллергия к бензоил пероксиду или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6).
Аллергическая реакция может включать сыпь и зуд кожи.

Особые указания и меры предосторожности

Поговорите с Вашим лечащим врачом или фармацевтом, прежде чем применять Витасилк:

- Следует избегать попадания препарата в глаза, рот, углы у носа и другие слизистые оболочки, такие как полость носа. В случае случайного попадания необходимо тщательно промыть их теплой водой.
- Витасилк не следует применять на поврежденную кожу.
- Витасилк может вызвать отек кожи или волдыри, и если у Вас возникли эти симптомы, Вы должны отменить применение препарата.
- Данный препарат может обесцвечивать волосы и цветные ткани, включая одежду, полотенца и постельное белье. Следует избегать контакта геля с данными материалами. Пожалуйста, убедитесь, что тщательно вымыли руки после применения геля.
- Следует соблюдать осторожность при применении Витасилка в области шеи и других чувствительных областей кожи.
- Следует избегать чрезмерного воздействия солнечного света или других источников УФ излучения (например, солярий).

Другие лекарственные препараты и Витасилк

Сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или должны принимать любые другие препараты.

- Вы не должны принимать препараты с отшелушивающим, раздражающим и подсушивающим эффектом одновременно с Витасилком.
- Не следует применять Витасилк с любыми другими препаратами для местного применения для лечения акне, за исключением случаев, когда лекарство рекомендовано лечащим врачом или фармацевтом, так как это может вызвать сильное покраснение и болезненность кожи.

Беременность и кормление грудью

- Если Вы беременны, думаете что можете быть беременной или кормите грудью, не применяйте данный препарат, за исключением случаев, когда он рекомендован Вашим лечащим врачом.
- Избегайте применения препарата в период грудного вскармливания, за исключением, если Ваш лечащий врач сам рекомендовал применение. Если лечащий врач рекомендовал применение данного препарата, во избежание контакта грудного ребенка с препаратом в период грудного вскармливания следует избегать нанесения геля на область груди.

Обратитесь за советом к врачу или фармацевту, прежде чем принимать какие-либо препараты.

Витасилк содержит пропиленгликоль

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Не следует применять данный препарат у 4-х недельных детей с открытыми ранами или обширными участками поврежденной кожи (например, ожоги) не посоветовавшись с врачом или фармацевтом.

3.Как применять Витасилк

Следует всегда применять Витасилк в точности так, как описано в данном листке-вкладыше или как рекомендовано Вашим лечащим врачом или фармацевтом. Если у Вас есть сомнения, Вы должны проконсультироваться с Вашим врачом или фармацевтом.

- **Витасилк предназначен только для наружного применения.**
- За исключением случаев, когда лечащий врач или фармацевт порекомендовали иное:
 - Промойте поврежденные участки кожи мягким моющим средством и водой, аккуратно высушите кожу.
 - Нанесите гель тонким слоем 1 или 2 раза в сутки или согласно предписанию на пораженные участки кожи.
 - Если у Вас чувствительная кожа наносите гель один раз в сутки, желательно перед сном.
 - Если нанесение геля сопровождается развитием сухости или шелушения кожи, то этого можно избежать, если изменить частоту применения препарата, например, один раз в день или один раз через каждые два дня, пока кожа адаптируется к препарату.
- Вы должны избегать воздействия сильного солнечного света, когда применяете Витасилк. Если это неизбежно, используйте подходящий солнцезащитный лосьон или наносите Витасилк вечером. Не забудьте смыть поврежденные участки кожи, прежде чем наносить препарат.
- Длительность применения Витасилка зависит от скорости улучшения состояния кожи. После применения препарата в течении 1 месяца, Вы должны снова проконсультироваться с Вашим врачом или фармацевтом, чтобы он убедился, что состояние улучшилась или нет.

Если Вы применили больше Витасилка, чем рекомендовано или случайно проглотили гель

- Если Вы случайно применили намного больше геля, чем рекомендовано, у Вас может наблюдаться раздражение кожи. Необходимо смыть кожу как можно большим количеством воды, и когда раздражение кожи проходит, можно продолжать применение препарата согласно предписанию.
- В редких случаях, когда Вы случайно проглотили данный препарат, обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить Витасилк

- Не беспокойтесь, если Вы забыли применить гель в нужное время. Как только вспомните, нанесите препарат в том режиме, в каком обычно применяете.

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы связи с использованием препарата, поговорите с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, Витасилк может вызвать побочные эффекты, хотя они и не появляются у каждого.

Если у Вас наблюдается сильное раздражение или покраснение, зуд или шелушение кожи, или если Вы чувствуете отек лица, **немедленно прекратите применение препарата и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.**

Немедленно сообщите Вашему врачу, если у Вас наблюдается тяжелая аллергическая реакция.

Симптомы тяжелых аллергических реакций включают:

- набухшие и зудящие высыпания на коже (крапивница),
- отек лица, глаз, губ, языка или рта (ангиоэдема), затруднение дыхания,
- обморок.

Витасилк может вызвать следующие побочные эффекты:

Очень часто: могут встречаться более чем у 1 из 10 человек

- сухость кожи,
- эритема,
- шелушение кожи,
- ощущение жжения кожи.

Часто: могут встречаться менее чем у 1 из 10 человек

- зуд кожи,
- болезненность кожи (боль, покалывание),
- раздражение кожи (контактный дерматит, вследствие раздражения).

Нечасто: может встречаться у 1 из 100 человек

- Аллергический контактный дерматит.

Эти симптомы обычно обратимы, если уменьшить частоту применения или прекратить применение препарата.

Отчетность о побочных эффектах:

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу, фармацевту или медсестре. Это включает любые возможные побочные эффекты не перечисленные в этом листке-вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.arpimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном

эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”. Телефон горячей линии научного центра: +37410237665; +37498773368

5. Как хранить Витасилк

- Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.
- Срок годности – 3 года. Не принимать Витасилк по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.

Не следует спускать любые лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6.Содержимое упаковки и дополнительная информация

Что содержит Витасилк

Каждый грамм Витасилк, 5% гель для наружного применения содержит:

активное вещество: бензоил пероксид (в форме гидрата) – 50 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер 940, гидроксид натрия, вода очищенная.

Как выглядит Витасилк и содержимое упаковки

Белый или почти белый однородный гель со специфическим запахом.

Описание упаковки

5% гель для наружного применения в тубе алюминиевом по 25 г вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Каковы условия отпуска Витасилка из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19 Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Владелец регистрационного удостоверения

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19 Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста