

**Листок-вкладыш
лекарственного средства
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО
суппозитории 500 мг**

**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО**

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ

-

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ

Суппозитории цилиндрической формы, от светло-желтого до темно-оранжевого цвета, с матовой и/или глянцевой поверхностью. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

1 суппозиторий содержит:

активное вещество: облепиховое масло - 500 мг;

вспомогательные вещества: твердый жир.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

C05AX. Препараты для лечения геморроя и анальной трещины для местного применения.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Геморрой, трещины заднего прохода, язвы прямой кишки, неспецифические проктиты и проктосигмоидиты, после реконструктивных операций на толстом кишечнике, лучевые поражения слизистой оболочки нижних отделов толстого кишечника.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к препарату.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

С осторожностью применять лицам с повышенной чувствительностью и предрасположенным к развитию аллергии.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ**

Не описаны.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование в педиатрии: Детям в возрасте до 6 лет препарат не назначают.

Беременность и период лактации

Нет ограничений к применению во время беременности и лактации.

Влияние на поведение человека, способность управлять автомобилем или механизмами: применение препарата не влияет на поведение человека, способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Применяют ректально. Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 суппозиторию 1 - 3 раза в сутки в течение 7 - 10 суток.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 7 - 10 суток.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

ПРОПУСК ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

При пропуске очередного применения лекарственного средства – не следует применять двойную дозу, необходимо продолжить лечение препаратом в рекомендованной дозировке.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Местные реакции: ощущение жжения, аллергические реакции, болезненность при длительном применении.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года.

Не использовать лекарственное средство по окончании срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта врача.

УПАКОВКА

Первичная упаковка: Суппозитории по 5 штук в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки.

Вторичная упаковка: По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,
Республика Молдова, MD-4829
www.farmaprim.md