

ИНСТРУКЦИЯ
НАФТИЗИН-АРСАНИТ-С 0.1%, 0.05%
(назальные капли стерильные)

Регистрационный номер

Торговое (патентованное) название препарата

Нафтизин-Арсанит-С

Международное (непатентованное) название препарата

Нафазолина нитрат

Состав

Назальные капли 0,05%

1 мл раствора содержит:

Действующее вещество

Нафазолина нитрат.....0,5мг

Назальные капли 0,1%

1 мл раствора содержит:

Действующее вещество

Нафазолина нитрат..... 1,0мг


Вспомогательные вещества

Борная кислота, вода очищенная.

Лекарственная форма

0.05% назальные капли для взрослых и детей старше 7 лет;

0.1% назальные капли для взрослых и детей старше 15 лет.



Описание

Прозрачная, бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

ATX - код

R01AA08

Фармакологическая группа

Деконгестант; Альфа 2-адреномиметическое средство.

Фармакологическое действие

Нафазолин является средством, стимулирующим симпатическую нервную систему, оказывает выраженное сосудосуживающее действие на периферические сосуды благодаря воздействию на альфа адренорецепторы. При нанесении на слизистые оболочки уменьшает отек, гиперемию, экссудацию, что обуславливает облегчение носового дыхания при ринитах. Нафазолин способствует открытию и расширению выводящих протоков придаточных пазух носа и евстахиевых труб, что улучшает отток секрета и препятствует осаждению бактерий.

При местном применении нафазолин полностью всасывается.

Терапевтическое действие наступает в течение 5 минут и длится 4-5 часов.

Показания к применению

Острый ринит, воспаление придаточных пазух носа, евстахеит, воспаление среднего уха.

Для уменьшения отека при диагностических и лечебных процедурах.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Сухое воспаление слизистой оболочки носа.

Детский возраст до 7 лет (0,05% раствор) и до 15 лет (0,1% раствор).

Предостережения

Не рекомендуется применять препарат при хронических ринитах.

Не рекомендуется применять препарат более 5 дней из-за снижения чувствительности к нему, уменьшения его клинической эффективности и риска развития медикаментозного ринита. Если симптомы сохраняются после 5 дней постоянного применения препарата, рекомендуется прекратить его прием и обратиться к врачу.

Препарат принимают с особой осторожностью при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), при сахарном диабете, гипертиреозе, феохромоцитоме и одновременно с ингибиторами МАО и другими потенциально гипертензивными препаратами.

SCIENTIFIC CENTER OF DRUG AND MEDICAL TECHNOLOGY

EXPERTISE CENTER ACADEMIC EMIL GABRIELYAN, JSC

Expert: Рубен

Applicant: МАО

Date: 03.12.2015

Осторожность необходима при проведении общей анестезии с применением анестетиков, повышающих чувствительность миокарда к симпатомиметикам (например, галотан), а также при бронхиальной астме.

Беременность и период лактации

Не рекомендуется использовать во время беременности и кормления грудью. Возможно, применение препарата, если только ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Применение препарата в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в каждый носовой ход, запрокинув голову немного назад и отклонив ее вправо при закапывании в левую ноздрю и влево – при закапывании в правую ноздрю.

С лечебной целью.

Взрослым и детям в возрасте от 15 лет – по 1-3 капли раствора 0,1% в каждый носовой ход.

Детям в возрасте от 7 до 15 лет – по 1-2 капли 0,05% раствора.

Препарат применяют 2-3 раза в день. Интервал между закапыванием должен быть не менее 4-х часов.

Препарат нельзя принимать более 5 дней взрослым и 3-х дням детям.

Повторно “Нафтизин-Арсанит-С” можно применять лишь через 7-10 дней.

В случае носового кровотечения можно использовать тампоны, смоченные раствором препарата.

С диагностической целью.


После очищения носовой полости в каждый носовой ход закапывают по 3-4 капли 0,05% раствора или вводят на 1-2 мин. тампон, смоченный в 0,05% растворе.

Передозировка

Передозировка или случайный прием внутрь препарата может вызвать системное побочное действие, которое проявляется нервозностью, повышенной потливостью, головной болью, трепетом, тахикардией, ощущением сердцебиения, повышением артериального давления.

Также возможны цианоз, тошнота, повышение температуры тела, спазмы, остановка сердца, отек легких, психические расстройства. Угнетающее действие на центральную нервную систему проявляется такими симптомами, как сонливость, брадикардия, снижение температуры тела, шоковое состояние, апноэ, кома.

Лечение симптоматическое.



Побочные эффекты

При соблюдении рекомендованных доз препарат обычно хорошо переноситься.

Иногда препарат может вызвать жжение и сухость слизистой оболочки носа.

В единичных случаях может появляться ощущение сильной заложенности носа.

Только в единичных случаях возникает системное побочное действие (чаще всего при передозировке):

нервная система: первознность, головная боль, трепет;

со стороны сердечной системы: тахикардия, ощущение сердцебиения;

со стороны сосудистой системы: артериальная гипертензия;

со стороны кожи и подкожных тканей: повышенная потливость.

Частое и продолжительное применение препарата (более 5 дней) может привести к привыканию, хронической заложенности носа и атрофии слизистой оболочки (атрофический ринит).

Лекарственное взаимодействие

Не совместим с ингибиторами МАО, трициклическими антидепрессантами, мапротилином или в течение нескольких дней после их отмены может вызвать повышение кровяного давления.

“Нафтизин-Арсанит-С” удлиняет действие местных анестетиков, применяемых для поверхностной анестезии.

Упаковка

Капли назальные: Флакон из стекла по 10мл - пачки картонные.

Срок годности

3 года.

Не использовать позднее срока годности, указанного на упаковке.


Условия хранения

Препарат следует хранить в защищенном от света месте, в выпускаемых производителем упаковках при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта врача.



Держатель регистрационного удостоверения / Производитель

ООО “Арсанит”

Армения, г. Масис, ул. Ереванян 110

Тел/Факс: 010524553 / +10524553

Дата 30.10.2015

