

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства**

ФИТОЛИЗИН®

Регистрационный номер:

Торговое название
ФИТОЛИЗИН®

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма
Паста для приема внутрь

Состав

100 г пасты содержат

активные вещества: сгущенный экстракт (1:1,3-1,6; спирт 45°) смеси: золотарника обыкновенного травы, хвоща полевого травы, горца птичьего травы, пырея корневищ, лука репчатого шелухи, березы листьев, пажитника семян, петрушки корней, любистока корней - 67,2 г; шалфея мускатного масло 1,0 г, мяты перечной масло 0,5 г, сосны обыкновенной масло 0,2 г, апельсина сладкого масло 0,15 г

вспомогательные вещества: глицерин 99,5%, агар, крахмал пшеничный, ванилин, этилпарагидроксибензоат (E214), вода очищенная

Описание

Мелкозернистая паста полутвердой консистенции, буро зеленого цвета со специфическим ароматическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие лекарственные средства, применяемые в урологии

КОД АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения. Обладает противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим и антимикробным действием. Мочегонное действие обусловлено производными флавоноидов, инозитом, сапонинами и силикатами. Последние также усиливают выведение мочевой кислоты при уратных отложениях в

почках, обладают способностью постепенного растворения уратных отложений. Компоненты эфирного масла обладают бактериостатическим, бактерицидным и противовоспалительным эффектами, увеличивают кровоснабжение почечных тканей и проницаемость стенок капилляров, что способствует повышению фильтрационной функции почек. Сапонины уменьшают поверхностное натяжение, приводят к образованию защитных коллоидов и эмульгированию патогенных компонентов мочи, препятствуют образованию мочевого «песка» и почечных конкрементов.

Показания к применению

Комплексная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей, нефроуролитиаз.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата (аллергические реакции на компоненты препарата)
- гломерулонефрит
- почечная недостаточность
- сердечная недостаточность
- фосфатный уrolитиаз
- возраст до 18 лет
- противопоказано при беременности и кормлении грудью

Способ применения

Обычная доза составляет :

Взрослые:

Взрослым назначают внутрь по 1 чайной ложке пасты, растворенной в 1/2 стакана теплой сладкой воды, 3-4 раза в день после еды.

Курс лечения: длительность терапии определяется врачом.

Средний курс лечения составляет от 2 недель до 1,5 месяцев.

Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет

Безопасность и эффективность препарата ФИТОЛИЗИН® у детей и подростков (до 18 лет) не были установлены.

Меры предосторожности при медицинском применении

Если симптомы усилятся, не пройдут или сопутствовать им будет лихорадка, боль и затрудненность мочеиспускания или наличие крови в моче, немедленно надо обратиться к врачу.

Не применять препарат в случае появления отеков, вызванных недостаточностью сердца или почек.

Во время применения препарата ФИТОЛИЗИН® рекомендуется применять большое количество жидкости.

ФИТОЛИЗИН® содержит в качестве вспомогательного вещества глицерин. Может вызвать головную боль, расстройство желудка и диарею.

ФИТОЛИЗИН® содержит также пшеничный крахмал. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но в незначительном количестве, и поэтому считается безопасным для пациентов с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (но не целиакией) не следует принимать этот препарат.

ФИТОЛИЗИН® содержит также этилпарагидроксibenзоат (E214), который может вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

ФИТОЛИЗИН® содержит этиловый спирт в количестве примерно 200 мг в одной дозе, что эквивалентно 5 мл пива или 2 мл вина. Содержание этилового спирта необходимо учитывать пациентам, страдающим алкоголизмом, пациентам с заболеваниями печени и эпилепсией.

Побочные действия

Как и все лекарственные препараты, ФИТОЛИЗИН® может вызывать нежелательные побочные эффекты, хотя они появляются не у всех.

Возможны аллергические реакции, в отдельных случаях тошнота.

При повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам возможны явления фотосенсибилизации.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До сих пор не выявлено.

В связи с мочегонным действием препарата следует учитывать возможность ускоренного выведения других, одновременно применяемых лекарственных средств.

ФИТОЛИЗИН® может усиливать действие:

- антикоагулянтов, нестероидных противовоспалительных препаратов
- гипогликемических лекарственных средств (лекарственные препараты, применяемые для лечения сахарного диабета)
- лекарственных средств, содержащих соли лития
- ингибиторов моноаминоксидазы (лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии)
- пролонгировать действие пентобарбитала (снотворный лекарственный препарат), аминопирина и парацетамола (нестероидные противовоспалительные препараты).

ФИТОЛИЗИН® может уменьшить всасывание бета-каротина, альфа-токоферола (витамин Е), холестерина и лекарственных средств в тонком кишечнике.

Пожалуйста, сообщите врачу, если Вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарственные средства, включая лекарства, приобретенные без рецепта.

Применение препарата во время беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточного клинического опыта, не рекомендуется применение препарата ФИТОЛИЗИН® в период беременности и грудного вскармливания.

Особенности влияния на способность управлять транспортом и потенциальноопасными механизмами

До сих пор не отмечено отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.). Однако следует учитывать содержание этанола в препарате.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Пропущение приема очередной дозы

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу!

Форма выпуска

Паста для приема внутрь. По 100 г в тубы алюминиевые, покрытые внутри лаком. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в закрытых упаковках при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача

Производитель

Гербаполь Варшава ООО

05-800 Прушкув, ул. Олувкова 54, Польша

Тел.: (48-22) 73-81-300

Факс: (48-22) 73-81-303

Владелец торговой лицензии

Гербаполь Варшава ООО

05-800 Прушкув, ул. Олувкова 54, Польша

Тел.: (48-22) 73-81-300, факс: (48-22) 73-81-303