

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

по медицинскому применению лекарственного средства  
(информация для пациента)

### Метилурацил

**Торговое название:** Метилурацил.

**Международное непатентованное название:** Метилурацил / Methyluracil.

**Лекарственная форма:** Мазь для наружного применения 100 мг/г.

**Описание:** Мазь желтоватого цвета, с характерным запахом ланолина.

**Состав:** действующее вещество - метилурацил – 1,5 г; вспомогательные вещества: парафин мягкий белый, ланолин безводный, вода очищенная.

**Фармакотерапевтическая группа:** Различные средства, способствующие рубцеванию.

Код АТХ – D03AX.

#### Показания к применению

Вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, фотодерматит; трофические язвы, пролежни, глубокие раны.

#### Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день. При эрозиях, язвах и ранах мазь наносят после предварительной обработки антисептиками. Срок лечения – до полного заживления.

Эффективность и безопасность применения мази в детском возрасте не установлена.

#### Побочное действие

Кратковременное легкое жжение, аллергические реакции.

#### Противопоказания

Избыточность грануляций (для местного применения). Острые и хронические лейкозы, другие злокачественные заболевания системы органов кроветворения, повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

### **Передозировка**

Редко – изменение состава периферической крови при длительном применении мази в больших дозах.

### **Меры предосторожности**

С осторожностью использовать при кожных заболеваниях, сопровождающихся образованием избыточных разрастаний ткани: вегетирующей пузырчатке, вегетирующей пиодермии, веррукозной форме эпидермодисплазии и др. Лекарственное средство следует применять с осторожностью при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических, на большие по площади участки кожи – при нарушениях обмена холестерина и тяжелых заболеваниях печени.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Можно назначать с другими дерматотропными средствами. Одновременное местное применение глюкокортикоидов ослабляет эффект мази.

### **Особые указания**

#### *Беременность и лактация*

Применение возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

*Влияние на способность управлять автомобилем и работать с другими механизмами*

Не влияет.

### **Упаковка**

По 15 г в тубе алюминиевой в упаковке № 1.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3,5 года. Лекарственное средство нельзя использовать позже срока, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Название и адрес изготовителя**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27, тел/факс +375(177)735612.