

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по медицинскому применению препарата**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** АКВА МАРИС

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения

**Состав:**

100 % стерильный гипертонический раствор воды Адриатического моря с натуральными солями и микроэлементами.

Не содержит консервантов.

Присутствие ионов:

Натрий ( $\text{Na}^+$ ) - не менее 7,50 мг/мл;

Кальций ( $\text{Ca}^{2+}$ ) - не менее 0,25 мг/мл;

Калий ( $\text{K}^+$ ) - не менее 0,20 мг/мл;

Магний ( $\text{Mg}^{2+}$ ) - не менее 1,00 мг/мл;

Хлориды ( $\text{Cl}^-$ ) - не менее 16,50 мг/мл;

Сульфаты ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) – не менее 1,80 мг/мл;

Гидрокарбонаты ( $\text{HCO}_3^-$ ) – не менее 0,10 мг/мл;

Бромиды ( $\text{Br}^-$ ) - не менее 0,04 мг/мл.

**Описание:** прозрачный бесцветный раствор со слабым характерным морским запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** препарат для лечения заболеваний горла.

**Код АТХ:** R02A

**Фармакологические свойства:**

Препарат на основе гипертонического стерильного раствора морской воды применяется с лечебными, профилактическими и гигиеническими целями для очищения, снятия раздражения и защиты слизистой оболочки горла.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, усиливают резистентность слизистой оболочки горла к болезнетворным бактериям и вирусам, способствуют повышению местного иммунитета.

**Показания к применению:**

-для профилактики и в комплексном лечении острых и хронических, инфекционных и воспалительных заболеваний горла (тонзиллит, аденоидит, фарингит, ларингит).

-для профилактики и в комплексном лечении ОРВИ (в том числе беременным женщинам и в период лактации);

-пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки задней стенки глотки вследствие повышенной сухости или загрязнения воздуха (центральное отопление, кондиционирование) с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки горла в измененных микроклиматических условиях.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к препарату.

**Способ применения и дозы:**

Спрей для местного применения.

Взрослым и детям 4 - 6 раз в сутки по 3 - 4 впрыскивания, направляя распылитель на заднюю стенку глотки.

Перед использованием повернуть распылитель в горизонтальное положение.

При использовании в первый раз нажать на крышку несколько раз.

**Побочные действия:** возможны аллергические реакции.

**Передозировка:** случаи передозировки не отмечены.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения воспалительных заболеваний горла.

**Меры предосторожности**

С осторожностью использовать детям младше 1 года.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Нет данных.

**Форма выпуска:**

По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета с распылительным устройством. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещён в картонную пачку.

**Срок годности:**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

**Производитель:**

АО «Ядран» Галенский Лабораторий. 51000, Пулац б/н, Риека, Хорватия.

**Представительство АО «Ядран» Галенский Лабораторий в Москве:**

119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф. 3, 30,

тел./факс: 970-18-82, 970-18-83