

Инструкция
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
Гевискон®

Регистрационный номер:

Торговое название препарат: Гевискон®

МНН или группировочное название: не имеет

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь [мятная]

Состав

10 мл суспензии содержат:

Активные вещества: натрия альгинат 500 мг, натрия гидрокарбонат 267 мг и кальция карбонат 160 мг, и *вспомогательные вещества:* карбомер 65 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия сахаринат 10 мг, масло мяты перечной 1 мг, натрия гидроксид 26,667 мг, вода очищенная до 10 мл.

Описание

Вязкая непрозрачная суспензия, от почти белого до кремового цвета, с мятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения рефлюкс-эзофагита.

Код АТХ: A02BX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. При приёме внутрь *Гевискон®* быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, имеющий почти нейтральное значение pH. Гель формирует защитную оболочку на поверхности содержимого желудка и действует до 4 часов, эффективно предотвращая возникновение гастро-эзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель с большей вероятностью, чем содержимое желудка, попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки.

Фармакокинетика. Механизм действия препарата *Гевискон®* является физическим процессом и не зависит от всасывания в системный кровоток.

Показания к применению

Симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в том числе в период беременности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 6 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Открытые контролируемые исследования с участием 281 беременной женщины и накопленный опыт применения не продемонстрировали каких-либо значимых нежелательных эффектов препарата *Гевискон*® на течение беременности или на здоровье плода и новорожденного ребенка. *Гевискон*® может применяться во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 10 – 20 мл после приёмов пищи и перед сном.

Максимальная суточная доза – 80 мл.

Дети от 6 до 12 лет: по 5 – 10 мл после приёмов пищи и перед сном.

Максимальная суточная доза – 40 мл.

Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм, анафилактические реакции).

Передозировка

Симптомы: Может отмечаться вздутие живота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Так как кальция карбонат, входящий в состав препарата проявляет антацидную активность, то между приемом *Гевискона*® и других препаратов должно пройти не менее 2 часов (особенно при одновременном приеме с блокаторами H₂-гистаминовых рецепторов, антибиотиков из группы тетрациклина, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тироксина, пенициллина, бета-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов, хлорохина, и дифосфатов).

Особые указания

В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 141 мг (6,2 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с очень ограниченным содержанием соли, например, в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и при нарушениях функции почек.

При отсутствии улучшения в симптоматике в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суспензия для приема внутрь [мятная].

По 100 мл, 150 мл или 300 мл во флаконы темного стекла с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Инструкция по применению находится под этикеткой.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15° до 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, Дэнсом Лейн, Халл, Ист Йоркшир, ХЮ8 7ДС, Великобритания.

Представительство в России/адрес для предъявления претензий

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Россия, 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14

Тел.: 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), contact_ru@reckittbenckiser.com