

1.3.1	Ivy leaf dry extract
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

Листок-вкладыш
Информация для потребителей

Гербион® сироп плюща
Сироп с сухим экстрактом листьев плюща

Торговое название

Гербион® сироп плюща (Herbion® ivy syrup)

Международное непатентованное название *Hederae heliсis folium*

Общая характеристика

Описание

Сироп желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом.

Допускается наличие осадка.

Состав

В 1 мл сиропа содержится 7 мг сухого экстракта листьев плюща (5 – 7,5 : 1).

Растворитель для экстракции: этанол 30% (м/м)

Вспомогательные вещества с известным действием

В 5 мл сиропа (1 мерная ложка) содержится 0,5 мг этанола (компонент ароматизатора с запахом мяты) и 1750 мг сорбитола (E420).

Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (некристаллизованный) (E420), глицерин (E422), натрия бензоат (E211), лимонная кислота моногидрат (E330), ароматизатор с запахом мяты (состоит из пропиленгликоля (E1520), этанола, масла цитронеллы, цитраля ex. *Litsea cubeba*, масла лимона и масла кориандра), вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп

Фармакотерапевтическая группа

Код АТХ: R05CA12. Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства

Гербион® сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща, основными компонентами которого являются тритерпеновые сапонины.

Показания к применению

Гербион® сироп плюща применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся продуктивным кашлем.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также растениям семейства аралиевых (*Araliaceae*).

Прием лекарственного средства противопоказан детям до 2 лет из-за риска утяжеления симптомов респираторного заболевания.

Способ применения и дозировка

1.3.1	Ivy leaf dry extract
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

Препарат противопоказан детям младше 2 лет.

Гербион® сироп плюща принимают утром или в первой половине дня вне зависимости от приема пищи. Рекомендовано запивать достаточным количеством теплой воды. Если симптомы сохраняются в течение недели после начала приема сиропа, то следует проконсультироваться с врачом. Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

1 мерная ложка содержит 5 мл сиропа.

Детям от 2 до 5 лет: 2,5 мл сиропа (0,5 мерной ложки) два раза в день (соответствует 35 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Детям от 6 до 12 лет: 5 мл сиропа (1 мерная ложка) два раза в день (соответствует 70 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Взрослым и детям старше 12 лет: 5 - 7,5 мл (1 – 1,5 мерной ложки) сиропа два раза в день (соответствует 70 – 105 мг сухого экстракта листьев плюща в день).

Пациенты с нарушением функции печени и/или почек

Пациентам с нарушением функции печени и/или почек прежде чем принимать Гербион® сироп плюща, следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить дозу препарата.

Меры предосторожности и особые указания

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Совместное применение с противокашлевыми средствами, такими как кодеин или декстрометорфан, не рекомендовано без предварительной консультации с врачом.

Пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка следует соблюдать осторожность.

Применение у детей

В случае длительного или возникающего повторно кашля у ребенка в возрасте 2-4 лет перед началом лечения необходима консультация врача для уточнения диагноза.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (E420). Пациентам с непереносимостью фруктозы не следует принимать данное лекарственное средство. Сорбитол может оказывать слабое слабительное действие.

Гербион® сироп плюща содержит глицерин, может вызвать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).

В препарате содержится небольшое количество этанола (спирта) - менее чем 100 мг на дозу 5 мл сиропа.

Беременность и лактация

В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендован.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

1.3.1	Ivy leaf dry extract
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и продуктами питания.

Передозировка

Не принимайте дозы, превышающие рекомендованные.

Симптомы: если Вы приняли дозу, превышающую суточную дозу более чем в два раза, возможны тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Лечение симптоматическое.

Не принимайте двойную дозу сиропа, чтобы компенсировать пропущенный прием.

Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно применения препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Побочное действие

Подобно всем лекарственным средствам Гербион® сироп плюща может вызывать побочные эффекты, которые проявляются не у всех.

Часто ($\geq 1/100$ до $< 1/10$):

- тошнота, рвота, диарея.

Нечасто ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$):

- аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы, кожной сыпи, купероза или затруднения дыхания.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Сообщения о предполагаемых побочных реакциях

В случае возникновения побочных реакций, пожалуйста, сообщите о них лечащему врачу. Это могут быть реакции, не указанные в листке-вкладыше.

Сообщая о побочной реакции, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности препарата.

Условия хранения

Не требует особых условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Не использовать позднее даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

150 мл сиропа в стеклянном флаконе с пластиковой крышкой, мерной ложкой и листком-вкладышем в картонной коробке.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.