

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению препарата**  
**ТЕРАФЛЮ® Экстра Лимон**

**Торговое название:** ТераФлю® Экстра Лимон

**Лекарственная форма:** Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

**Описание:**

Сыпучий порошок, содержащий крупные гранулы белого и желтого цвета, допускается наличие мягких комков.

**Состав:**

Один пакетик содержит:

*Активные компоненты:* парацетамола 650 мг, фенирамина малеат 20 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг

*Вспомогательные компоненты:* сахароза, калия ацесульфам, краситель желтый Е 104, краситель желтый Е 110, мальтодекстрин М 100, кремния диоксид, ароматизатор лимонный 860098 TD 1091, ароматизатор лимонный 860202 TD 0991, лимонная кислота безводная, натрия цитрат дигидрат, кальция фосфат трехосновный.

**Фармакотерапевтическая группа:** Анальгетики. Прочие анальгетики и жаропонижающие средства.

**Код АТХ:** N02BE51

**Фармакологические свойства:** Комбинированный препарат, обладает жаропонижающим, противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим и противоаллергическим действием.

**Показания к применению:** кратковременное симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ, грипп), сопровождающихся высокой температурой, сильным ознобом, ломотой в теле, головной и мышечной болью, насморком, заложенностью носа, чиханием.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания.

Не применять у детей до 12 лет.

С осторожностью назначать при: артериальной гипертензии, сахарном диабете, закрытоугольной глаукоме, тяжелых заболеваниях печени или почек, гиперплазии предстательной железы, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

**Способ применения и дозы:**

Взрослым и детям старше 12 лет.

Внутрь. Содержимое пакетика растворяют в 1 стакане кипяченой горячей воды. Употребляют в горячем виде. Можно добавить сахар по вкусу.

Повторную дозу можно принимать через каждые 4 часа (не более 3 доз в течение 24 часов).

ТераФлю® Экстра можно применять в любое время суток, но наилучший эффект приносит прием препарата перед сном, на ночь. Если не наблюдается облегчения

симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

**Побочные эффекты:** Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек), повышенная возбудимость, нарушение сна, снижение скорости психомоторных реакций, сонливость, головокружение, тошнота, рвота, боли в желудке, сердцебиение, повышение артериального давления, сухость во рту, парез аккомодации, повышение внутриглазного давления, задержка мочи. При длительном применении в больших дозах - гепатотоксическое действие, нарушения картины крови (редко – анемия), нефротоксичность.

**Передозировка:** Тошнота, рвота, боли в эпигастральной области; гепатотоксическое и нефротоксическое действие, в тяжелых случаях - печеночная недостаточность, энцефалопатия и коматозное состояние.

Лечение: промывание желудка, применение активированного угля и симптоматическая терапия. Введение метионина через 8-9 часов после передозировки, и ацетилцистеина – через 12 ч.

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами:** Усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных препаратов, этанола. Рекомендуется воздержаться от приема препарата при приеме ингибиторов МАО.

Риск гепатотоксического действия парацетамола повышается при одновременном приеме барбитуратов, дифенина, карбамазепина, рифампицина, зидовудина и других индукторов микросомальных ферментов печени. Антидепрессанты, противопаркинсонические, антипсихотические средства, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров.

**Меры предосторожности:** Во избежание токсического поражения печени прием препарата не следует сочетать с применением алкогольных напитков.

Следует соблюдать осторожность при использовании препарата у лиц в возрасте старше 70 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за возможного проявления сосудосуживающего действия фенилэфрина.

Если не смотря на прием препарата, заболевание сопровождается продолжающейся лихорадкой или повторными повышениями температуры, необходимо обратиться к врачу.

Не превышать рекомендуемые дозы.

Не следует использовать препарат из поврежденных пакетиков.

**Влияние на способность водить автомобиль и управлять механизмами.**

Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении автомобилем или другими механизмами, требующими концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.

**Форма выпуска:** По 15 г порошка в пакетик из комбинированного материала. По 10 пакетиков вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. Дополнительно текст инструкции по применению наносится на пакетик.

**Условия хранения:** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Производитель:** Новartis Консьюмер Хелс СА, Швейцария,  
произведено Famar Orleans, Франция. 5, Авеню де Консир, 45071, Орлеан, Франция.

**Представительство в России/Адрес для предъявления претензий:**

123317, Москва, Пресненская наб.10,

тел. (495) 969 21 65.

E-mail: [consumerhealth@novartis.ru](mailto:consumerhealth@novartis.ru)