

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИТРУМ® ВИЖН ФОРТЕ

Регистрационный номер:

Наименование лекарственного средства (торговое наименование):

ВИТРУМ® ВИЖН ФОРТЕ

Лекарственная форма с указанием наименований и количественного содержания фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ:

Одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Активные действующие вещества:

Аскорбиновая кислота (Витамин С)	60	мг
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	10	мг ¹
Рибофлавин (Витамин В ₂)	1,2	мг
Бетакаротен	1,5	мг
Лютеин	6	мг
Зеаксантин	0,5	мг
Рутозид ²	25	мг
Селена аминокислота в пересчете на селен	25	мкг
Цинка оксид в пересчете на цинк	5	мг
Черники обыкновенной плодов экстракт сухой с содержанием суммы антоцианов 25% ³	60	мг

¹ - эквивалентно 10 МЕ витамина Е.

² - синоним рутин.

³ - Черники обыкновенной плодов экстракт сухой с содержанием суммы антоцианов 25%.

Производящее растение: Черника обыкновенная - *Vaccinium myrtillus* L, семейство:

Вересковые - Ericaceae.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат дигидрат 350,07 мг, стеариновая кислота 39,25 мг, целлюлоза микрокристаллическая 31,75 мг, кремния диоксид коллоидный 15,50 мг, кроскармеллоза натрия 14,50 мг, магния стеарат 8,00 мг; оболочка: гипромеллоза 7,85 мг, титана диоксид 3,85 мг, пропиленгликоль 0,001 мг, макрогол-400 0,0001 мг, опадрай II

желтый (поливиниловый спирт, тальк, титана диоксид, мкрогол-3350, лецитин соевый, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный) 42,30 мг

Описание:

Таблетки овальной формы, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой от желтовато-белого цвета с коричневатым оттенком до светло-желтого цвета.

Допускается наличие специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: Поливитаминное средство + прочие препараты

Код АТХ: [A11AB].

Фармакологические свойства

Поливитамино-минеральный комплекс с растительными компонентами. Содержит лютеин, зеаксантин и черники обыкновенной плодов экстракт. Оказывает антиоксидантное действие (защищает глазную ткань от воздействия свободных радикалов). Оказывает метаболическое действие, укрепляет капилляры глаза, усиливает остроту зрения (в т.ч. у больных с осложненной миопией), улучшает сумеречное зрение, улучшает зрение при повышенных нагрузках на глаза.

Показания для применения:

Зрительное утомление (усталость и боль в глазах) при чтении, ношении контактных линз, работе с компьютером; комплексная терапия близорукости различной степени, диабетической ретинопатии, центральной и периферической дистрофии сетчатки; период восстановления после оперативных вмешательств на глазах; нарушение механизмов адаптации зрения к темноте.

Противопоказания для применения:

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата. Детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке два раза в день после еды. Курс лечения 3 месяца. Повторные курсы – по рекомендации врача.

Меры предосторожности при применении:

Не превышать рекомендуемую дозу.

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке:

Симптомы передозировки: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Возможные побочные действия при применении лекарственного препарата:

Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Указание возможности и особенностей медицинского применения лекарственного препарата беременными женщинами, женщинами в период грудного вскармливания:

Перед приемом препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данные об особенностях медицинского применения лекарственного препарата беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания отсутствуют.

Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Не оказывает влияния на вождение автомобиля и управление другими механизмами.

Срок годности и указание на запрет применения лекарственного препарата по истечении срока годности:

3 года. Не использовать по окончании срока годности.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре 10 - 30 °С.

Указание на необходимость хранения лекарственного препарата в местах, недоступных для детей:

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска:

Таблетки покрытые пленочной оболочкой.

По 15 таблеток покрытых пленочной оболочкой в блистере из алюминиевой фольги/ПВХ. 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:

Производитель: Юнифарм, Инк., США

Претензии направлять в адрес:

Представительство в России: 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б,
тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru