

1.3.1	Pikovit forte
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

ИНСТРУКЦИЯ
информация по медицинскому
применению препарата

ПИКОВИТ® ФОРТЕ
(PIKOVIT® FORTE)

Торговое название препарата: ПИКОВИТ® ФОРТЕ

Лекарственная форма и назначение: Пастилки. Для приема внутрь.

Описание: круглые, двояковыпуклые пастилки, оранжевого цвета.

Состав

Одна пастилка содержит:

Активные компоненты:

Retinolum (витамин А, в виде ретинил пальмитата)	5000 МЕ
Cholecalciferolum (витамин D ₃)	400 МЕ
Acidum ascorbicum (витамин С)	60 мг
Nicotinamidum (никотинамид)	20 мг
α-Tocopheroli acetat (витамин Е в виде α-токоферил ацетата)	15 мг
Calcii pantothenas (кальция пантотенат)	10 мг
Pyridoxini chloridum (витамин В ₆)	2,00 мг
Riboflavinum (витамин В ₂)	1,70 мг
Thiamini nitras (витамин В ₁)	1,50 мг
Acidum folicum (фолиевая кислота)	0,40 мг
Суанособаламинум (витамин В ₁₂)	6,00 мкг

Вспомогательные вещества: малтитол, сироп малтитола, маннитол, аспартам (содержит фенилаланин), повидон, стеарат магния, глицерин, капол 600, касторовое масло, полисорбат 80, коллоидный гель окиси кремния, β-каротин, двуокись титана (Е171) и корригент со вкусом мандарина.

Фармакотерапевтическая группа

Поливитамины. Код АТС [А11А]

Фармакологические свойства

Пастилки Пиковит форте содержат 11 наиболее важных витаминов в количествах, соответствующих рекомендуемой суточной дозе для детей в возрасте от 7 лет и старше.

Фармакодинамика

Витамины группы В (В₁, В₂, В₆, В₁₂, пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров. Фолиевая кислота необходима для нормального синтеза, регенерации и функционирования клеток крови. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D регулирует поступление кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С способствует абсорбции железа и принимает участие во многих окислительно-

1.3.1	Pikovit forte
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

восстановительных процессах в организме. Витамин Е является физиологическим антиоксидантом, который защищает мембраны клеток и поддерживает функцию клеток. Пастилки Пиковит форте содержат некариесогенные подслащающие вещества малтитол, маннитол и аспартам, поэтому они не оказывают неблагоприятное воздействие на зубы.

Фармакокинетика

Водорастворимые витамины (витамины группы В и витамин С) очень хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся с мочой и, иногда, с калом. Они накапливаются в организме только в ограниченных количествах, поэтому регулярный прием этих витаминов важен для поддержания необходимых концентраций в тканях.

После перорального приема жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонкой кишке в присутствии жиров. Абсорбция витамина Е довольно слабая (25 - 85% дозы). Более высокие количества жирорастворимых витаминов накапливаются в печени и, поэтому, являются более токсичными, чем водорастворимые витамины.

Показания к применению

Пастилки Пиковит форте рекомендуется принимать, когда существует повышенная потребность организма в витаминах и при недостаточном и несбалансированном питании. К этим случаям относятся:

- переутомление и недостаточная концентрация внимания у детей школьного возраста
- физическая нагрузка (в том числе занятия спортом)
- неполноценное и несбалансированное питание (сниженная сопротивляемость инфекциям)
- снижение или отсутствие аппетита
- при лечении антибиотиками
- сезонный недостаток свежих овощей и фруктов.

Способ применения и дозы

Пастилка Пиковита форте остается во рту до полного рассасывания.

Детям в возрасте старше 7 лет рекомендуется принимать по 1 пастилке один раз в день после еды.

В случае недостаточного аппетита пастилки следует давать ребенку ежедневно в течение 2 месяцев, в остальных случаях пастилки следует давать по мере необходимости.

Особые указания

Беременные женщины и кормящие матери могут принимать витамины по рекомендации врача.

При необходимости одновременного приема других витаминных препаратов следует проконсультироваться у врача.

Больные сахарным диабетом могут принимать пастилки Пиковит форте, тем не менее, следует помнить, что одна пастилка содержит 0.6 г малтитола. Для метаболизма малтитола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте, потребность в инсулине мала. Энергетическая ценность одной пастилки составляет прилб. 6 кДж (1,4 ккал).

В состав Пиковит форте входит аспартам, содержащий фенилаланин, поэтому препарат не рекомендуется принимать пациентам с фенилкетонурией.

1.3.1	Pikovit forte
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

Противопоказания

Не следует давать Пиковит форте если ранее отмечалась реакция повышенной чувствительности к любому из ингредиентов, содержащихся в препарате.

При гипervитаминозе А и D.

Не рекомендуется давать пастилки Пиковит форте детям в возрасте младше 7 лет.

Побочное действие

Прием рекомендуемых доз пастилок Пиковита форте не вызывает побочного действия.

Возможны аллергические реакции на препарат. В таких случаях следует прекратить прием пастилок и проконсультироваться у врача.

Пастилки Пиковит форте содержат 0,6 г малтитола, в связи с этим, прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать диарею.

Форма выпуска

30, 45 или 60 пастилок (2, 3 или 4 блистера по 15 пастилок в картонной коробке).

Срок годности

3 года.

Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C, в защищенном от света и влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения