

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного средства

### **АЛЬБУЦИД ЛИКВО**

капли глазные

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Торговое название:** Альбуцид Ликво

**Международное непатентованное название:** сульфацетамид

**Лекарственная форма:** капли глазные 20 %.

**Состав:** активное вещество: сульфацетамид натрий - 200 мг/мл; вспомогательные вещества: спирт поливиниловый - 1,4 %, натрия тиосульфат - 1,5 мг/мл, натрия фосфат однозамещенный - 1,56 мг/мл, натрия фосфат двузамещенный - 0,71 мг/мл, динатрия эдетат - 0,01 мг/мл, бензалкония хлорид - 0,005 %, вода для инъекций.

**Описание:** Бесцветная или с желтоватым оттенком прозрачная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа** – Противомикробное средство, сульфаниламид.

**Код АТС** – S01AB04

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Сульфаниламид широкого спектра действия, бактериостатик. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, кишечной палочки, а также хламидий, актиномицетов и др.

### **Фармакокинетика**

При местном применении проникает в ткани и жидкости глаза. Может проникать в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву, однако из-за незначительного количества препарата системный эффект не определяется.

### **Показания к применению**

Конъюнктивиты, блефариты, гнойные язвы роговой оболочки и др. Инфекционные заболевания глаз, вызванные микроорганизмами, чувствительными к сульфаниламидам; комплексное лечение трахомы.

### **Противопоказания**

Токсико-аллергические реакции на сульфаниламиды.

### **Способ применения и дозы**

Инстилляции по 1-2 капли каждые 2-3 часа первоначально. Курс лечения 7-10 дней. При трахоме – инстилляции по 2 капли каждые 2 часа.

### **Побочные действия**

Местное раздражение, жжение, неспецифический конъюнктивит, конъюнктивальная гиперемия, развитие вторичной инфекции (бактериальные и грибковые изъязвления роговицы), синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, молниеносный некроз печени, агранулоцитоз, апластическая анемия, гиперчувствительность к компонентам препарата.

### **Передозировка**

Следует уменьшить дозу препарата, увеличить интервал между применением глазных капель или отменить препарат.

### **Особые указания**

При длительном применении возможно: увеличение невосприимчивых к препарату микроорганизмов, включая грибы; развитие бактериальной устойчивости. При первых симптомах развития гиперчувствительности применение препарата следует отменить.

У пациентов с повышенной индивидуальной чувствительностью к фуросемиду, тиазидовым диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы может проявляться повышенная чувствительность к сульфацетамиду натрия.

При ношении мягких контактных линз необходимо снять линзы за пять минут до инстилляций и надеть через 15 мин после принятия лекарства.

### ***Применение при беременности и в период кормления грудью***

Применение в период беременности и кормления грудью возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода.

### ***Влияние на способность водить и использовать машины***

Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, сразу после закапывания препарата не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим оборудованием, требующим четкости зрения.

### **Лекарственное взаимодействие**

Совместное применение с новокаином и дикаином снижает бактериостатический эффект препарата. Наблюдается несовместимость сульфацила натрия при его совместном применении с солями серебра.

### **Форма выпуска**

Флаконы-капельницы из полиэтилена по 5 мл.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия содержимое флакона использовать в течение месяца.

### **Условия отпуска из аптек**

Отпускается по рецепту.

**Производитель**



ЗАО «Ликвор», Армения  
0089, Ереван, Кочиняна 7/9  
Тел.: 37460 378800  
E-mail: info@liqvor.com

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. P. Matvosyan".

Матевосян С. Р.

