

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

# ОТОФА

**Регистрационный номер:** П N015456/01

**Торговое название:** ОТОФА

**МНН:** Рифамицин

**Лекарственная форма:** капли ушные

**Состав** (на 100 мл):

*Действующее вещество:*

Рифамицин натрия ..... 2,6 г,  
что соответствует 2 000 000 МЕ

*Вспомогательные вещества:*  
Макролол 400 ..... 25,000 г  
Аскорбиновая кислота ..... 0,500 г  
Динатрия эдетат ..... 0,012 г  
Калия дисульфит ..... 0,150 г  
Лития гидроксид ..... 0,135 г  
Очищенная вода ..... до 100 мл

**Описание**

Прозрачный раствор красно-оранжевого цвета.

**Код ATХ:** S02AA12

**Фармакотерапевтическая группа**

Антибиотик - рифамицин

**Фармакологические свойства**

Антибиотик из группы рифамицинов для местного применения в отоларингологии. Оказывает бактерицидное действие. Механизм действия рифамицина связан с образованием стабильного комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой, который препятствует росту бактерий. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих развитие инфекционно-воспалительных заболеваний среднего уха.

**Показания для применения**

Острый наружный отит; обострения хронического среднего отита (в т.ч. при наличии стойкой перфорации барабанной перепонки); состояния после оперативных вмешательств на среднем ухе.

**Противопоказания для применения**

Повышенная чувствительность к рифамицину или другим компонентам препарата.

**Способ применения и дозы**

**Взрослым:** закапывают в ухо по 5 капель 3 раза в сутки или вводят марлевую турунду с предварительно нанесенным на неё препаратом в наружный слуховой проход 2 раза в сутки.

Препарат может быть использован для промывания барабанной полости через аттиковую канюлю.

**Детям:** закапывают в ухо по 3 капли 3 раза в сутки или вводят марлевую турунду с предварительно насыщенным на неё препаратом в наружный слуховой проход 2 раза в сутки.

Длительность лечения – не более 7 дней.

**Меры предосторожности при применении**  
Не применять.

**Передозировка**

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

**Побочное действие**

Редко - кожные аллергические реакции: крапивница, кожный зуд, мелкоточечная кожная сыпь.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не выявлено.

**Особые указания**

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо.

Следует избегать контактов препарата с одеждой, т.к. раствор может оставлять пятна на ткани.

Местные реакции: розовая окраска барабанной перепонки (видимая при отоскопии).

**Беременность и период грудного вскармливания**

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата в периоды беременности и лактации не проводилось.

При беременности и лактации применение возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

**Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

**Форма выпуска**

Капли ушные 2,6 %.

По 10 мл во флакон темного стекла с резиновой пробкой и алюминиевой крышкой. Каждый флакон вместе с пипеткой и инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

**Срок годности**

3 года

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель лекарственного препарата:**

Лаборатории Бушара-Рекордати  
68, rue Маржолен – 92300  
Леваллуа-Перре, Франция

**Все претензии по качеству препарата направлять:**

РОССИЯ 123610 Москва,  
Краснопресненская наб.12,  
ЦМТ, «Международная-2», офис 747  
тел.: (495) 258 20 06, факс: (495) 258 20 07

V55076.05