

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата  
(информация для пациентов)

### ТОПЕПСИЛ®

таблетки покрытые оболочкой  
25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг

Топирамат

**Полностью и внимательно прочтите эту инструкцию перед началом применения данного лекарственного препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.**

- Сохраните этот листок. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу, фармацевту или лицу, оказывающему Вам помощь.
- Это лекарственное средство назначено Вам лично. Не передавайте его другим людям. Оно может нанести им вред, даже если у них имеются те же симптомы заболевания.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

**Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию**

1. Что такое препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой и для чего его применяют
2. Что следует знать до начала приема препарата Топепсил® таблетки покрытые оболочкой
3. Как следует принимать препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой
4. Возможные побочные эффекты
5. Как следует хранить препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Содержимое упаковки и другая информация

#### **1. Что такое препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой и для чего его применяют**

Топепсил® относится к группе препаратов называемых «противоэпилептическими».

Его применяют:

- В качестве монотерапии для лечения судорожных припадков у взрослых и детей старше 6 лет.
- В комбинации с другими препаратами для лечения судорожных припадков у взрослых и детей в возрасте 2 года и старше.
- Для предотвращения мигренозных головных болей при мигрени у взрослых.

#### **2. Что следует знать до начала приема препарата Топепсил® таблетки покрытые оболочкой**

**Не принимайте препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой в следующих случаях:**

- Если у Вас аллергия к топирамату или любым другим вспомогательным веществам препарата Топепсил®, приведенным в разделе 8.
- Для профилактического лечения мигрени, если Вы беременны, либо если возможно наступление беременности, а Вы не пользуетесь достаточно эффективными средствами контрацепции (см. дополнительную информацию в разделе «Беременность и кормление грудью»).

Если Вы не уверены в том, что сказанное выше относится к Вам, обсудите это с Вашим лечащим врачом или фармацевтом до начала приема препарата Топепсил®.

#### **Меры предосторожности при медицинском применении**

Перед началом приема препарата Топепсил® таблетки покрытые оболочкой проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом, если Вы:

- страдаете нарушениями со стороны почек, особенно мочекаменной болезнью, или находитесь на гемодиализе

- когда-либо страдали заболеваниями крови и биологических жидкостей организма (метаболическим ацидозом)
- страдаете заболеваниями печени
- страдаете заболеваниями глаз, особенно глаукомой
- страдаете нарушениями роста
- находитесь на диете с высоким содержанием жиров (кетогенная диета)
- наблюдаете нарушение умственных функций

Если Вы не уверены в том, что сказанное выше относится к Вам, обсудите это с Вашим лечащим врачом или фармацевтом до начала приема препарата Топепсил®.

Важно, чтобы Вы не прекращали прием препарата, пока не проконсультируетесь с врачом.

Также Вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать любые препараты, содержащие топирамат, которые Вам назначат вместо препарата Топепсил®.

Если Вы принимаете препарат Топепсил®, у Вас может уменьшиться масса тела, поэтому при лечении этим препаратом необходимо регулярно контролировать массу тела. Если масса тела у Вас снижается слишком сильно, или у ребенка на фоне лечения этим препаратом масса тела увеличивается недостаточно, необходимо проконсультироваться с врачом.

У небольшого числа людей на фоне лечения противосудорожными препаратами, в том числе препаратом Топепсил®, появляются мысли о причинении себе вреда или даже самоубийстве. Если в любой момент Вы заметите у себя подобные мысли, немедленно обратитесь к врачу.

#### **Другие лекарственные средства и препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой**

Сообщите Вашему лечащему врачу или фармацевту о любых лекарственных средствах, которые Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать, включая препараты, отпускаемые без рецепта. Топепсил® и некоторые другие препараты могут влиять на действие друг друга. Иногда требуется изменить дозы других принимаемых Вами препаратов или препарата Топепсил®.

В частности, сообщите Вашему лечащему врачу или фармацевту, если Вы принимаете:

- Другие препараты, влияющие на мышление, концентрацию, координацию движений, или нарушающие их (например, подавляющие активность центральной нервной системы, в частности, миорелаксанты и седативные препараты).
- Противозачаточные средства. Топепсил® может снижать эффективность противозачаточных средств.

Сообщите Вашему лечащему врачу обо всех изменениях менструального цикла, которые наблюдаются у Вас в период приема противозачаточных средств и препарата Топепсил®.

Составьте список лекарств, которые Вы принимаете. Прежде, чем начинать лечение новым препаратом, покажите этот список Вашему лечащему врачу и фармацевту.

Кроме того, Вам следует обсудить с Вашим лечащим врачом или фармацевтом прием ряда других препаратов, в том числе других противосудорожных препаратов, рisperидона, препаратов лития, гидрохлоротиазида, метформина, пиоглитазона, глибурида, амитриптилина, пропранолола, дилтиазема, венлафаксина, флунаразина, фитопрепаратов, содержащих зверобой (*Hypericum perforatum*).

Если Вы не уверены в том, что сказанное выше относится к Вам, обсудите это с Вашим лечащим врачом или фармацевтом до начала приема препарата Топепсил®.

#### **Прием препарата Топепсил® таблетки покрытые оболочкой с пищей, напитками и алкоголем**

Топепсил® можно принимать вне зависимости от приема пищи. На фоне лечения препаратом Топепсил® принимайте в течение дня большое количество жидкости, чтобы не допустить образования мочевых камней. При лечении препаратом Топепсил® избегайте употребления спиртных напитков.

#### **Фертильность, беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете иметь ребёнка, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала применения этого препарата.

#### Беременность

Ваш лечащий врач решит, можно ли Вам принимать Топепсил®. Применение топирамата, как и других противоэпилептических препаратов, при беременности сопровождается риском нанесения вреда неродившемуся ребенку. Вам следует четко представлять себе соотношение пользы и риска применения препарата Топепсил® для лечения эпилепсии при беременности.

Вы не должны принимать Топепсил® для профилактики мигрени, если Вы беременны или если возможно наступление беременности, но Вы не используете эффективные средства контрацепции.

#### Грудное вскармливание

Кормящие матери, принимающие препарат Топепсил®, должны как можно скорее сообщить лечащему врачу, если у ребенка появляются какие-либо необычные симптомы.

*Перед приемом любых препаратов проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.*

#### **Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с механизмами**

Во время лечения препаратом Топепсил® могут развиваться головокружение, утомляемость, нарушения зрения. Прежде чем садиться за руль, пользоваться инструментами и работать с механизмами, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

#### **Препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой содержит лактозу**

Препарат Топепсил® содержит лактозу. Если лечащий врач сообщал Вам, что Вы страдаете непереносимостью некоторых сахаров, перед началом приема данного препарата обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого лекарственного средства.

### **3. Как следует принимать препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой**

Всегда принимайте данный препарат в точном соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.

#### Режим дозирования

Обычно лечащий врач начинает лечение препаратом Топепсил® с небольших доз, и постепенно повышает дозу до тех пор, пока не будет определена наиболее эффективная для Вас доза.

#### Способ применения

- Таблетки Топепсил® следует проглатывать целиком. Старайтесь не разжевывать таблетки, поскольку они могут оставить во рту горький вкус.
- Препарат Топепсил® можно принимать до, во время или после еды. На фоне лечения препаратом Топепсил® потребляйте в течение дня большое количество жидкости, чтобы не допустить образования мочевых камней.

#### **Если Вы приняли больше препарата Топепсил® таблетки покрытые оболочкой, чем назначено**

- Немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой упаковку препарата.
- Вы можете почувствовать сонливость или усталость, либо у Вас могут появиться необычные телодвижения, нарушения при попытке стоять и ходить, затруднения речи или концентрации внимания, двойное зрение или нарушение зрения, ощущения головокружения вследствие низкого артериального давления, подавленное настроение или волнение, боли в животе или судорожные припадки.

Передозировка может развиваться также в случае, когда Вы принимаете вместе с препаратом Топепсил® другие препараты.

#### **Если Вы забыли принять препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой**

- Если Вы забыли принять дозу препарата, примите ее сразу же, как только вспомните об этом. Однако если уже подходит время приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу, а продолжайте лечение по обычной схеме. Если Вы пропустили две дозы или более, обратитесь к лечащему врачу.
- Не принимайте двойную дозу препарата для возмещения пропущенной (две таблетки одновременно).

#### **Если Вы прекратили прием препарата Топепсил® таблетки, покрытые оболочкой**

Не прекращайте прием препарата до тех пор, пока Ваш лечащий врач не предложит Вам это сделать. Симптомы Вашего заболевания могут возобновиться. Если Ваш лечащий врач принял решение о прекращении приема данного препарата, дозы препарата должны быть снижены постепенно, в течение нескольких дней.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

#### **4. Возможные побочные эффекты**

Как и все другие лекарственные препараты, данный препарат может вызвать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех пациентов.

Частоту развития возможных побочных эффектов, перечисленных ниже, определяют согласно следующему:

*Очень частые* (развиваются более, чем у 1 пациента из 10);

*Частые* (развиваются не более, чем у 1 пациента из 10);

*Нечастые* (развиваются не более, чем у 1 пациента из 100);

*Редкие* (развиваются не более, чем у 1 пациента из 1 000);

*Очень редкие* (развиваются не более, чем у 1 пациента из 10 000);

*Неизвестные* (по имеющимся данным частоту развития установить невозможно).

**Немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу и попросите, чтобы Вам оказали медицинскую помощь, если у Вас развиваются следующие побочные эффекты:**

**Очень частые:**

- депрессия

**Частые:**

- судорожные припадки
- тревожность, раздражительность, изменения настроения, спутанность сознания, нарушения ориентировки
- проблемы, связанные с концентрацией внимания, замедление процесса мышления, потеря памяти, нарушение памяти (первые проявления или внезапное изменение или ухудшение тяжести этого процесса)
- камни в почках, частое или болезненное мочеиспускание

**Нечастые:**

- повышение уровня кислотности крови (может вызвать одышку, чувство нехватки воздуха, потерю аппетита, тошноту, рвоту, повышенную утомляемость, учащение или нарушение сердечного ритма)
- уменьшение или отсутствие потоотделения
- мысли о нанесении себе вреда и попытки нанесения себе вреда

**Редкие:**

- глаукома (застой жидкости в глазу, что приводит к повышению внутриглазного давления, боли или ухудшению зрения)
- тяжелые реакции со стороны кожи, включая угрожающей жизни синдром Стивенса-Джонсона, при котором происходит отслоение внешнего слоя кожи, и многоформную эритему – состояние, сопровождающееся развитием приподнимающейся над поверхностью кожи красной сыпи и волдырей

**Частота неизвестна:**

- токсический эпидермальный некролиз (токсическое отмирание верхнего слоя кожи), представляющее собой более тяжелую форму синдрома Стивенса-Джонсона

**Другие побочные эффекты:**

**Очень частые**

- Потеря веса
- Ощущение покалывания в руках и ногах
- Сонливость
- Головокружение
- Диарея
- Тошнота

- Заложенность носа, насморк, боль в горле
- Утомляемость

#### **Частые**

- Изменения поведения, в том числе гнев, нервозность, агрессия
- Повышение массы тела
- Снижение или потеря аппетита
- Снижение количества эритроцитов в крови (анемия)
- Смазанная речь, проблемы, связанные со словесной коммуникацией, нарушения речи
- Неуклюжесть, изменение координации движений, нарушения походки
- Нарушения умственной функции
- Нарушение способности выполнения задач ежедневной деятельности
- Потеря интереса
- Успокоительное действие
- Непроизвольное дрожание рук и ног
- Снижение осязательной и общей чувствительности
- Непроизвольные движения глаз
- Изменение вкусовой чувствительности
- Нарушения зрения, нечеткое зрение, двоение в глазах, ухудшение зрения, ухудшение аккомодации
- Головокружение (вертиго)
- Звон в ушах
- Боль в ушах
- Нехватка воздуха
- Кашель
- Кровотечение из носа
- Заложенность носа
- Рвота
- Запор
- Боли в животе, неприятные ощущения в животе или в желудке
- Воспаления желудка
- Нарушения пищеварения
- Инфекции желудка или кишечника
- Сухость во рту
- Ощущения покалывания или онемения во рту
- Выпадение волос
- Кожные высыпания и/или кожный зуд
- Боли в суставах
- Мышечные спазмы, судорожные движения мышц, мышечная слабость
- Боли в грудной клетке
- Лихорадка
- Упадок сил (астения)
- Общее недомогание
- Аллергические реакции (например, кожная сыпь, покраснение, зуд, отек лица, крапивница)
- Трудность засыпания или трудность сна без ночных пробуждений

#### **Нечастые побочные эффекты**

- Появление кристаллов или небольших камней в мочевыводящей системе
- Нарушения в клиническом анализе крови, в том числе снижение числа белых кровяных телец (лейкопения) или тромбоцитов (красных пластинок) или повышение числа эозинофилов
- Нерегулярность или замедление сердечного ритма, чувство сильного сердцебиения в грудной клетке
- Отечность шейных, подмышечных или паховых лимфоузлов
- Повышение частоты развития судорожных припадков
- Нарушения способности к чтению и речевого общения
- Слюнотечение
- Беспокойство или повышение умственной и физической активности
- Потеря сознания

- Обмороки
- Замедление или уменьшение объема движений
- Непроизвольные ненормальные или повторные движения мышц
- Нарушение продолжительности или качества сна, повышенная сонливость
- Ослабление или нарушение обоняния
- Нарушения почерка
- Ощущение шевеления под кожей
- Нарушения со стороны глаз, в том числе сухость в глазах, повышение чувствительности к свету, произвольные движения, слезотечение, ухудшение зрения, выпадение полей зрения, непривычные ощущения в глазах, судорожные сокращения век, ощущение яркого света в глазах
- Снижение или потеря слуха, односторонняя потеря слуха, неприятные ощущения в ушах
- Огрубление голоса (дисфония)
- Воспаление поджелудочной железы
- Газообразование в кишечнике
- Изжога
- Нарушение чувствительности в полости рта, ухудшение вкусовых восприятий
- Кровотечение из десен, повышенное слюноотделение
- Ощущение переполнения или вздутия живота, боль в животе, болезненность при нажатии
- Неприятные ощущения в верхней части живота
- Ощущение болезненности или жжения во рту
- Запах изо рта
- Болезненность языка
- Непроизвольное выделение мочи, появление крови в моче
- Императивные позывы на мочеиспускание, болезненность в паховой области
- Боль в области почек
- Ощущение опьянения
- Нервозность
- Пониженная чувствительность лица
- Крапивница
- Покраснение кожи и зуд на всей поверхности тела
- Изменение цвета кожи
- Локализованная отечность кожи
- Воспаление кожи, вызванное аллергией
- Отечность лица
- Отечность суставов
- Скованность скелетных мышц, боль в боку
- Чувство усталости в мышцах
- Снижение содержания калия в крови
- Повышение аппетита
- Лихорадка
- Жажда, потребление ненормально повышенного количества жидкости
- Низкое артериальное давление или снижение артериального давления при вставании (вследствие этого у некоторых пациентов, принимающих топирамат может развиваться головокружение, предобморочное ощущение или обморок при внезапном изменении положения тела из положения лежа в положение сидя или при вставании)
- Приливы крови, ощущение жара
- Гриппоподобное заболевание
- Вялость
- Похолодание конечностей (например, кистей рук, пальцев ног и лица)
- Снижение способности к обучению
- Нарушения сексуальной функции (эректильная дисфункция, утрата либидо)
- Галлюцинации
- Отсутствие способности к спонтанному речевому общению
- Повышение уровня печеночных ферментов
- Эйфория, повышенное настроение

- Апатия, эмоциональная уплощенность (отсутствие эмоций, невозможность проявить эмоции)
- Необычная подозрительность
- Панический приступ
- Замедление мышления, нарушение бодрствования и концентрации внимания
- Ненормальное чувство осязания, изменение чувства осязания
- Плач
- Заикание
- Повторная речь, персеверации
- Отвлекаемость
- Чувство жжения
- Нарушение чувствительности
- Мозжечковый синдром (наследственное нарушение мозговой функции, влияющее на координацию движений)
- Ступор (пациент практически не реагирует на стимулы, за исключением болевых)
- Неуклюжесть
- Непривычное чувство/ощущение, которое может быть предвестником мигрени или некоторых видов судорожных припадков)
- Периферическая невропатия (поражение нервов рук и ног)
- Чувство нехватки воздуха при нагрузке
- Повышенная продукция секрета в придаточных пазухах
- Ненормальные результаты теста координации походки («тандем теста»)

#### **Редкие побочные эффекты**

- Понижение количества белых кровяных телец (нейтропения)
- Повышение кислотности крови
- Ненормально повышенное настроение (мания, гипомания)
- Паническое расстройство
- Чувство отчаяния
- Потеря способности выполнять выученные, комбинированные движения (апраксия)
- Нарушение ритма сна
- Чрезмерная чувствительность кожи
- Воспаление печени, печеночная недостаточность
- Нарушение обоняния
- Дрожание (эссенциальный тремор)
- Невозможность инициации (начала) движений (акинезия)
- Отсутствие реакции на стимулы
- Слепота в одном глазу, временная слепота, ночная слепота, проблемы со зрением, связанные с нарушениями аккомодации, дефект восприятия глубины со светлыми, осциллирующими точками
- Отечность глаз и тканей вокруг глаз
- Затуманенное зрение
- Развитие небольших камней в мочеточниках (каналах, соединяющих почки с мочевым пузырем)
- Повышенная кислотность в почечных канальцах (нарушение почечной функции)
- Неприятный запах кожи
- Отек тканей вокруг глаз и отек лица
- Местная крапивница
- Чувство дискомфорта рук и ног
- Синдром Рейно. Это заболевание, поражающее кровеносные сосуды пальцев, стоп, ушей, сопровождающееся болью и повышением чувствительности к холоду
- Кальцификация тканей (кальциноз)
- Пониженный уровень ионов бикарбоната в крови

#### **Частота неизвестна**

- Макулопатия — поражение макулы — зрительного пятна, небольшого участка сетчатки с наиболее высокой четкостью зрения. Если Вы заметите изменение или снижение остроты зрения, обратитесь к Вашему лечащему врачу
- Отеки, связанные с аллергией

- Отечность конъюнктивы глаз
- Нарушение движения глаз

### **Дети и подростки**

Побочные эффекты у детей обычно сходны с побочными реакциями взрослых. Однако, некоторые побочные эффекты либо встречаются более часто, и/или могут быть более тяжелыми у детей, чем у взрослых.

К побочным эффектам с более тяжелым течением у детей относятся отсутствие потоотделения и повышение уровня кислотности в крови.

Побочные эффекты, которые встречаются более часто у детей, включают заболевания верхних дыхательных путей.

По результатам двойных-слепых контролируемых исследований, побочные эффекты, встречающиеся более часто у детей (с двукратной частотой или выше), чем у взрослых, включают следующие:

пониженный аппетит, повышенный аппетит, гиперхлоремический ацидоз (повышение концентрации ионов хлора в крови), гипокалиемия, ненормальное поведение, агрессия, апатия, трудность засыпания, мысли о самоубийстве, нарушение концентрации внимания, вялость, апатичность, нарушение суточного ритма сна, ухудшение качества сна, повышенное слезотечение, замедление сердечного ритма (синусная брадикардия), странное/ненормальное самочувствие, нарушения походки.

Побочные эффекты, которые встречаются только у детей, но не у взрослых, включают следующие: эозинофилия, психомоторная гиперреактивность, головокружение (вертиго), рвота, повышение температуры тела (гипертермия), лихорадка (пирексия), потеря способности к обучению.

### **Сообщения о побочных эффектах**

При возникновении любых побочных эффектов или обнаружении эффектов, не упомянутых в данной инструкции, обратитесь к врачу или фармацевту.

Сообщая о побочных эффектах, Вы сможете получить дополнительную информацию о безопасности этого препарата.

## **5. Как следует хранить препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой**

Данный лекарственный препарат не требует особых условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой, если обнаружите видимые признаки порчи (например, изменение цвета).

## **6. Срок годности**

Срок годности указан на упаковке.

Не используйте препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Датой окончания срока годности является последний день указанного месяца.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в бытовые отходы или сточные воды. Если необходимо удалить в отходы препарат, который больше не нужен, проконсультируйтесь с фармацевтом. Эти меры помогут предотвратить загрязнение окружающей среды.

## **7. Условия отпуска из аптек**

Отпускается по рецепту врача.

## **8. Содержимое упаковки и другая информация**

### **Что содержит препарат Топепсил® таблетки покрытые оболочкой**

*Действующее вещество:* топирамат.

Каждая таблетка покрытая оболочкой препарата Топепсил® содержит 25 мг, 50 мг, 100 мг, или 200 мг топирамата.

*Вспомогательные вещества:*



*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 25 мг*

Лактозы моногидрат, натрия карбоксиметилкрахмал (тип А), коповидон, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, гипромеллоза, полидекстроза, макрогол 8000, титана диоксид, триэтилцитрат

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 50 мг*

Лактозы моногидрат, натрия карбоксиметилкрахмал (тип А), коповидон, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, железа оксид красный, железа оксид желтый, макрогол 3350, поливиниловый спирт, тальк, титана диоксид

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 100 мг*

Лактозы моногидрат, натрия карбоксиметилкрахмал (тип А), коповидон, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, макрогол 3350, поливиниловый спирт, тальк, титана диоксид, железа оксид желтый

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 200 мг*

Лактозы моногидрат, натрия карбоксиметилкрахмал (тип А), коповидон, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, железа оксид красный, макрогол 3350, поливиниловый спирт, тальк, титана диоксид

**Внешний вид препарата Топесил® и содержимое упаковки**

Внешний вид

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 25 мг*

Белые, круглые, двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой с гравировкой буквы «Т» на одной стороне таблетки и числа «25» на другой стороне.

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 50 мг*

Оранжевые, круглые, двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой с гравировкой буквы «Т» на одной стороне таблетки и числа «50» на другой стороне.

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 100 мг*

Жёлтые, круглые, двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой с гравировкой буквы «Т» на одной стороне таблетки и числа «100» на другой стороне.

*Топесил® таблетки покрытые оболочкой 200 мг*

Розовые, круглые, двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой с гравировкой буквы «Т» на одной стороне таблетки и числа «200» на другой стороне.

Упаковка

14 таблеток покрытых оболочкой расфасованы в блистер. 2 блистера (28 таблеток) вместе с инструкцией по применению упакованы в картонную пачку.

**ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЦЕНЗИИ НА МАРКЕТИНГ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1106 Будапешт, ул. Керестури, 30-38,

ВЕНГРИЯ

**Производственная площадка:**

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1165 Будапешт, ул. Бёкенфельди, 118-120,

ВЕНГРИЯ