



Бепантен®

ОДОБРЕНО
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь
Регистрационное удостоверение
№ 1218/95/02/06/11

Торговое название

Бепантен.

Международное непатентованное название

Декспантенол.

Лекарственная форма

Мазь.

Описание

Гомогенная мазь белого цвета с желтоватым оттенком со специфическим запахом ланолина.

Состав

1 г мази содержит

Активный ингредиент: декспантенол 50 мг.

Неактивные ингредиенты: цетиловый спирт, стеариловый спирт, пчелиный воск белый (E901), парафин белый мягкий, миндальное масло, парафин жидкий, ланолин (E913), протегин X, очищенная вода.

Фармакологические свойства

Декспантенол – активный компонент, в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. При местном применении декспантенол абсорбируется быстрее, чем пантотеновая кислота.

Пантотеновая кислота является компонентом жизненно важного коэнзима А, в виде ацетилкоэнзима А играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Она необходима для образования эпителия и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек.

В плазме крови пантотеновая кислота связывается с белками (с β -глобулином и альбумином). Выводится из организма с мочой и калом в неизменном виде.

Показания к применению

Активизация процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах и ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи и эрозии шейки матки; при лечении кортикостероидами.

Уход за сухой и потрескавшейся кожей.

Профилактика и лечение опрелостей у грудных детей.

Регулярный уход за молочными железами в период кормления грудью, лечение болезненности или трещин сосков.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносить мазь один или более раз в день по необходимости.

Уход за молочными железами кормящих матерей: наносить на соски после каждого кормления.

Уход за грудным ребенком: наносить при каждой смене подгузника (пеленки).

Побочные действия

Аллергические реакции: контактный и аллергический дерматит, зуд, экзема, эритема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

Декспантенол хорошо переносится даже в высоких дозах и считается не токсичным.

Особые указания и меры предосторожности

Следует избегать попадания мази в глаза. Воск, стеариловый и цетиловый спирты могут вызвать местные реакции кожи (например, контактный дерматит).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Другие взаимодействия

В случае лечения ран в генитальной или анальной области из-за адьювантов сопутствующее использование латексных презервативов приводит к снижению их прочности и разрывам, тем самым снижает безопасность презервативов.

Беременность и лактация

Препарат можно использовать во время беременности по рекомендации врача. В период лактации при лечении трещин сосков необходимо удалять остатки мази перед кормлением.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

Туба 3,5 г или 30 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

ГП Гренцах Продукционс ГмбХ,
Эмиль-Барелл-Штрассе 7, D-79639 Гренцах-Вилен, Германия

