

БЕПАНТЕН®
Листок-вкладыш
(для пациентов)

Торговое название

Бепантен.

Международное непатентованное название

Декспантенол.

Лекарственная форма

Крем.

Описание

Гомогенный непрозрачный крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым запахом.

Состав

1 г крема содержит

Активный ингредиент: декспантенол 50 мг.

Неактивные ингредиенты: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К, цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин (E913), изопропилмиристат, пропиленгликоль (E1520), очищенная вода.

Фармакологические свойства

Декспантенол – активный компонент, в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. При местном применении декспантенол абсорбируется быстрее, чем пантотеновая кислота.

Пантотеновая кислота является компонентом жизненно важного коэнзима А, в виде ацетилкоэнзима А играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Она необходима для образования эпителия и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек.

В плазме крови пантотеновая кислота связывается с белками (с β-глобулином и альбумином). Выводится из организма с мочой и калом в неизменном виде.

Показания к применению

Активизация процессов заживления при мелких повреждениях кожи: легких ожогах и ссадинах; при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения; при хронических язвах, пролежнях, анальных трещинах, пересадке кожи и эрозии шейки матки; при лечении кортикостероидами.

Уход за сухой и потрескавшейся кожей.

Профилактика и лечение опрелостей у грудных детей.

Регулярный уход за молочными железами в период кормления грудью, лечение болезненности или трещин сосков.

Способ применения и дозы

Наружно. Наносить крем один или более раз в день по необходимости.

Уход за молочными железами кормящих матерей: наносить на соски после каждого кормления.

Уход за грудным ребенком: наносить при каждой смене подгузника (пеленки).

Побочные действия

Аллергические реакции: контактный и аллергический дерматит, зуд, экзема, эритема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

Декспантенол хорошо переносится даже в высоких дозах и считается не токсичным.

Особые указания и меры предосторожности

Следует избегать попадания крема в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Беременность и лактация

Препарат можно использовать во время беременности по рекомендации врача. В период лактации при лечении трещин сосков необходимо удалять остатки крема перед кормлением.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

Туба 30 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

ГП Гренцах Продукционс ГмбХ,
Эмиль-Барелл-Штрассе 7, D-79639 Гренцах-Вилен, Германия