

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению лекарственного препарата  
для медицинского применения  
**КАМЕТОН**

**Регистрационное удостоверение**

**Торговое название препарата:** Каметон

**Лекарственная форма**

аэрозоль для местного применения

**Описание**

Маслянистая жидкость, находящаяся под давлением в баллоне с дозирующим клапаном. Препарат при выходе из баллона распыляется в виде аэрозоля, представляющего собой диспергированные в газовой среде жидкие частицы с характерным запахом.

**Состав на один баллон**

*Активные вещества:* хлоробутанола гемигидрат (в пересчете на 100% вещество) - 0,2 г или 0,3 г, камфора (в пересчете на 100 % вещество) - по 0,2 г или 0,3 г, левоментол (в пересчете на 100 % вещество) - 0,2 г или 0,3 г, масло эвкалиптовое - 0,2 г или 0,3 г.

*Вспомогательные вещества:* изопропилмиристат - 9,2 г или 13,8 г, тетрафторэтан - 20 г или 30г.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство

**Код АТХ [R02AA20]**

**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное "отвлекающее" действие.

**Показания к применению**

Воспалительные заболевания ЛОР-органов (ринит, фарингит, ларингит и др.).

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 5 лет).

**Способ применения и дозы**

Распыляют в ротовую полость и носовые ходы (снимают предохранительный колпачок с распылителя и, введя его в полость рта или носа, нажимают на его основание в течение 1-2 секунд).

В течение суток ингаляции повторяют 3-4 раза.

**ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА БАЛЛОН СЛЕДУЕТ ДЕЖАТЬ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ВВЕРХ!**

**Побочное действие**

Аллергические реакции.

**С осторожностью**

Баллон не вскрывать и не нагревать.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период грудного вскармливания нет. В связи с низкой системной абсорбцией компонентов, входящих в состав препарата, его местное применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимого взаимодействия препарата с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

**Особые указания**

При воспалительных заболеваниях носа удобнее пользоваться баллоном с дозирующим клапаном.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Передозировка**

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

**Форма выпуска**

Аэрозоль для местного применения.

По 30 г или 45 г в баллонах алюминиевых или стеклянных, снабженных дозирующими клапанами, распылителями и защитными колпачками.

1 баллон с инструкцией по применению в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии**

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,  
www.pharmstd.ru