

ТОНЗИЛОТРЕН
таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациентов

Внимательно прочтайте этот листок- вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.

*Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова.
Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у Вашего фармацевта.*

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

*активные вещества: Atropinum sulfuricum (атропина сульфат) trit. D5 12,5 мг, Непар sulfuris (гепар сульфур) trit. D3 10 мг, Kalium bichromicum (калия бихромат) trit. D4 50 мг, Silicea (кремнезем) trit. D2 5 мг, Mercurius bijodatus (ртути (II) йодид) trit. D8 25 мг;
прочие ингредиенты (наполнители): лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.*

Форма выпуска

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Показания

Острый и хронический тонзиллит, увеличение миндалин; для ускорения заживления после хирургического удаления миндалин.

Противопоказания

Препарат нельзя применять при известной гиперчувствительности к хрому или к любому другому ингредиенту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

Особые предостережения и особые меры предосторожности

Если Ваш врач говорил Вам, что у Вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать Тонзилотрен.

Клинических данных по применению лекарственного средства у детей младше 6 лет недостаточно. По этой причине применение Тонзилотрена ~~детьми младше 6 лет не рекомендовано~~ рекомендовано.

По аналогии со всеми прочими фармацевтическими препаратами принимать Тонзилотрен во время беременности и в периоде лактации можно только после предварительной консультации с врачом.

EXPERTISE AUFER ACADEMIC EMIL GABRIELYAN» JSC
Export 1 *Debashty*

Applicant *Stratmann*
Date *11-05-14*



Применять Тонзилотрен для лечения пациентов, страдающих от гиперфункции щитовидной железы, можно только после предварительной консультации с врачом.

Проконсультируйтесь с врачом:

- если острое состояние не улучшается, или ухудшается после первых 2 дней лечения;
- если возникают дополнительные жалобы, к примеру, жар выше 39°C.

Режим дозирования и способ применения

При отсутствии иных указаний Тонзилотрен применяют следующим образом:

При острых состояниях:

Дети от 6 до 12 лет принимают по 1 таблетке каждые два часа, максимум до 6 таблеток в день первые 1-2 дня лечения, до наступления улучшений. После этого следует принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Взрослые и дети от 12 лет и старше принимают по 1 таблетке каждый час, максимум до 12 таблеток в день в течение первых 1-2 дней лечения до наступления улучшений. После этого следует принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

В случае сохранения острого состояния или ухудшения в течение 2 дней лечения, следует отменить препарат и проконсультироваться с врачом.

При хроническом тонзиллите и увеличении миндалин дети от 6 до 12 лет получают по 1 таблетке 3 раза в день, а взрослые и дети старше 12 лет – по 1-2 таблетки 3 раза в день. Лечение рекомендуется продолжать в течение 4-6 недель.

При хроническом рецидивирующем тонзиллите считается целесообразным проведение нескольких циклов лечения на протяжении одного года (после консультации с врачом).

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

Вредные эффекты передозировки препарата Тонзилотрен не известны.

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, например, высыпания на коже. В таких случаях следует отменить Тонзилотрен и проконсультироваться с врачом. При усилении слюноотделения после приема препарата Тонзилотрен рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.


Срок годности

5 лет.

Дата истечения срока годности указана на упаковке и на этикетке. *Не применять* препарат после этой даты.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 25 °C недоступном для детей месте.



Упаковка

Упаковка по 60 таблеток, по 20 таблеток в блистере.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, 76227 Karlsruhe
Ottostrasse 24
Tel. +49 (721) 40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ, Германия

«SCIENTIFIC CENTRE OF DRUG AND MEDICAL TECHNOLOGY
EXPERTISE AFTER ACADEMIC EMIL GABRIELYAN» JSC

Expert 1 Себастьян
Expert 2 _____
Date 28.04.2015

Applicant Швабе
Date 11-05-15

