

Листок-вкладыш: Информация для пациента

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочитайте инструкцию.

- Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.
- Данный лекарственный препарат выписан лично Вам. Не передавайте его другим лицам. Препарат может им навредить, даже если их симптомы заболевания сходны с Вашими.
- В случае возникновения серьезных побочных эффектов, или новых побочных эффектов, не упомянутых в данной инструкции, следует немедленно обратиться к врачу или фармацевту.

Содержание:

1. Что такое АЦЦ[®], и для чего он предназначен
2. Перед тем, как начать принимать препарат АЦЦ[®], обратите внимание
3. Как принимать АЦЦ[®] 200
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить АЦЦ[®] 200
6. Дополнительная информация

АЦЦ[®] 200 таблетки шипучие

Действующее вещество: ацетилцистеин 200 мг

1. Что такое АЦЦ[®], и для чего он предназначен

АЦЦ[®] 200 – муколитик, для разжижения вязкой мокроты в дыхательных путях.

АЦЦ[®] 200 применяется для разжижения и облегчения выведения мокроты при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густой и трудноотделимой мокроты.

2. Перед тем, как начать принимать препарат АЦЦ[®], обратите внимание.

Не принимайте АЦЦ[®] 200, если у вас гиперчувствительность (аллергия) к ацетилцистеину или любому из компонентов препарата АЦЦ[®] 200.

АЦЦ[®] 200 не следует применять для лечения детей в возрасте младше 2 лет.

Будьте особенно осторожны при лечении АЦЦ[®] 200

При лечении препаратом следует соблюдать осторожность, если Вы страдаете бронхиальной астмой, а также, если у Вас в анамнезе или в настоящее время имеется язва желудка или кишечника, при кровохаркании, легочном кровотечении, пациентам с варикозным расширением вен пищевода, фенилкетонурией, заболеваниях надпочечников, почечной и/или печеночной недостаточности.

Пациентам с непереносимостью гистамина также следует соблюдать осторожность. У таких пациентов следует избегать применения длительных терапевтических курсов, поскольку АЦЦ[®] 200 оказывает влияние на метаболизм гистамина и может вызвать симптомы непереносимости (например, головная боль, насморк, зуд).

Во время применения ацетилцистеина в очень редких случаях наблюдалось возникновение тяжелых кожных реакций, таких как синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. В случае возникновения изменений со стороны кожи и слизистых оболочек следует немедленно прекратить прием ацетилцистеина и обратиться за помощью к врачу.

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период кормления грудью.

Прием других препаратов

Сообщите вашему лечащему врачу или фармацевту, если Вы принимаете/используете или недавно принимали/использовали любые другие медицинские препараты, включая препараты, выдаваемые без рецепта.

Противокашлевые препараты

При комбинированном применении АЦЦ® 200 и препаратов, подавляющих кашель (противокашлевые), может возникнуть опасный застой секрета вследствие угнетения кашлевого рефлекса. Поэтому подобные комбинации следует подбирать с осторожностью. Поэтому перед началом применения такого комбинированного лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Антибиотики

В экспериментальных исследованиях было показано, что ацетилцистеин ослабляет эффективность антибиотиков (тетрациклинов, аминогликозидов, пенициллинов). С целью безопасности прием антибиотиков следует производить отдельно от приема ацетилцистеина, с соблюдением, как минимум, 2-х часового интервала. Это не относится к препаратам, содержащим в качестве действующего вещества цефексим или лоракарбеф. Их можно принимать одновременно с ацетилцистеином.

При контакте ацетилцистеина с металлами, резиной образуются сульфиды с характерным запахом.

Беременность и кормление грудью

Беременность

До настоящего времени не имеется достаточного количества данных о применении ацетилцистеина беременными женщинами. Поэтому прием препарата АЦЦ® 200 не рекомендуется при беременности и в период кормления грудью.

Кормление грудью

Данных о способности ацетилцистеина проникать в грудное молоко не имеется. Поэтому прием препарата АЦЦ® 200 не рекомендуется при беременности и в период кормления грудью.

Управление автомобилем и работа с механизмами

Особые требования отсутствуют.

Важная информация о некоторых компонентах АЦЦ® 200

Одна шипучая таблетка содержит 5,7 ммоль (131,0 мг) натрия. Это следует учитывать при применении препарата у пациентов, находящихся на диете с контролируемым содержанием натрия.

3. Как принимать АЦЦ® 200

При отсутствии других назначений рекомендуется придерживаться следующих дозировок АЦЦ® 200. Чтобы препарат АЦЦ® 200 действовал должным образом, следует точно соблюдать указания инструкции по применению!

Возраст	Общая суточная доза (шипучие таблетки)
Дети в возрасте от 2 до 5 лет	½ шипучей таблетки 2-3 раза в день (эквивалентно 200-300 мг ацетилцистеина в сутки)
Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет	1 шипучая таблетка два раза в день (эквивалентно 400 мг ацетилцистеина в сутки)
Подростки в возрасте старше 14 лет и взрослые	1 шипучая таблетка 2-3 раза в день (эквивалентно 400-600 мг ацетилцистеина в сутки)

Муковисцидоз

Подростки и дети в возрасте старше 6 лет

1 шипучая таблетка 3 раза в день (эквивалентно 600 мг ацетилцистеина в сутки)

Дети в возрасте от 2 до 6 лет

½ шипучей таблетки 4 раза в день (эквивалентно 400 мг ацетилцистеина в сутки)

Способ применения

АЦЦ® 200 следует принимать после еды.

Шипучая таблетка растворяется в стакане питьевой воды, и содержимое стакана полностью выпивается.

При растворении препарата необходимо пользоваться стеклянной посудой, избегать контакта с металлами, резиной, кислородом, легко окисляющимися веществами.

Продолжительность применения препарата

При кратковременных простудных заболеваниях длительность приема составляет 5 – 7 дней. При хроническом бронхите и муковисцидозе препарат следует применять более длительными курсами с целью профилактики развития инфекций.

Если Вам кажется, что действие АЦЦ® 200 слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Если вы превысили дозу АЦЦ® 200

В случае превышения дозы препарата может возникнуть раздражение желудочно-кишечного тракта (например, боль в животе, тошнота, рвота, диарея).

До настоящего времени не наблюдалось тяжелых побочных эффектов и признаков интоксикации препаратом, даже в условиях значительной передозировки. В случае предполагаемой передозировки АЦЦ® 200 следует обратиться к лечащему врачу.

Если Вы забыли принять препарат АЦЦ® 200

Если Вы пропустили один прием препарата АЦЦ® 200 или приняли слишком малую дозу, дождитесь времени приема очередной дозы и продолжайте прием препарата как указано в рекомендациях по дозированию.

Если Вы прекращаете принимать АЦЦ® 200

Не следует прекращать прием АЦЦ® 200 без предварительной консультации с лечащим врачом. В таком случае может наступить обострение заболевания.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы касательно использования данного препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные препараты, АЦЦ® 200 может вызывать побочные эффекты, хотя они появляются не у каждого.

Оценка побочных эффектов основывается на частоте их возникновения:

очень часто:	более чем у 1 из 10 пациентов
часто:	у 1 - 10 пациентов из 100
нечасто:	у 1 - 10 пациентов из 1 000
редко:	у 1 - 10 пациентов из 10 000
очень редко:	менее чем у 1 из 10 000 пациентов
не установлено:	согласно доступным данным установить невозможно

Побочные эффекты

Общие расстройства и состояние мест введения препарата

Нечасто: головная боль, лихорадка, аллергические реакции (зуд, сыпь по типу крапивницы, кожная сыпь, одышка, учащенное сердцебиение и падение артериального давления)

Очень редко: анафилактические реакции вплоть до шока

Расстройства со стороны дыхания, грудной клетки, средостения

Редко: одышка, бронхоспазм – главным образом у пациентов с повышенной реактивностью бронхиальной системы на фоне бронхиальной астмы

Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта

Нечасто: стоматит, боль в животе, тошнота, рвота и диарея

Очень редко при применении ацетилцистеина наблюдалось возникновение кровотечения, иногда сопровождающегося реакциями гиперчувствительности.

Необходимые меры предосторожности

В случае появления первых признаков гиперчувствительности (смотрите выше) препарат АЦЦ® 200 повторно применять нельзя. О таких случаях необходимо сообщать лечащему врачу.

В случае возникновения серьезных побочных эффектов, или новых побочных эффектов, не упомянутых в данной инструкции, следует немедленно обратиться к врачу или фармацевту.

5. Как хранить АЦЦ® 200

Хранить в сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Держать тубу плотно закрытой.

Срок годности 3 года.

Не используйте препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе.

Срок годности оканчивается в последний день указанного месяца.

6. Дополнительная информация

Действующим веществом является ацетилцистеин.

1 таблетка шипучая содержит 200 мг ацетилцистеина.

Вспомогательные вещества: Аскорбиновая кислота, лимонной кислоты ангидрид, лактозы ангидрид, маннитол, натрия цитрат, натрия гидрокарбонат, сахарин натрия, ароматизатор ежевичный.

АЦЦ® 200 выпускается по 20 шипучих таблеток в тубах с полиэтиленовой пробкой, по 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Производитель: Салютас Фарма ГмбХ, Германия – компания группы «Сандоз».

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Дата пересмотра листка-вкладыша - Июнь 2013 года.