

**Инструкция по применению
лекарственного средства для потребителей
(аннотация-вкладыш)
ТЕРАФЛЕКС® (THERAFLEX®)**

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства. Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции. Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения, обратитесь к врачу.

Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Торговое название

Терафлекс.

Лекарственная форма

Капсулы.

Описание

Прозрачные твердые желатиновые капсулы размером № 00, наполненные белым с незначительными оттенками либо светло-бежевым порошком с кристаллическими частицами.

Состав

Действующие вещества (1 капсула содержит):

глюкозамина гидрохлорид 500 мг, хондроитина сульфат 400 мг.

Вспомогательные вещества: желатин, стеариновая кислота, магния стеарат, марганца сульфат.

Фармакологические свойства

Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, участвует в построении хрящевой ткани. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, и стимулирует регенерацию суставного хряща. Хондроитина сульфат снижает активность воспалительного процесса на ранних стадиях, и таким образом замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует уменьшению боли, улучшению функции суставов.

Глюкозамина гидрохлорид обладает хондропротекторными свойствами, снижает дефицит гликозаминогликанов в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты.

Показания к применению

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника; остеоартроз I-III стадии, остеохондроз.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 15 лет первые три недели назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки; в последующие дни – по 1 капсуле 2 раза в сутки, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет от 3 до 6 месяцев. При необходимости возможно проведение повторных курсов лечения, продолжительность которых устанавливается индивидуально.

Побочное действие

Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко наблюдаются диспепсия, ощущение незначительной тошноты, возможна боль в эпигастральной области, диарея, запор, вздутие кишечника.

Со стороны иммунной системы: в редких случаях – аллергические реакции, включая гиперемию и сыпь на коже, зуд, крапивницу, ангионевротический отек.

Со стороны кожи и ее структур: выпадение волос.

Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, общая слабость, сонливость, нарушение зрения.

Все перечисленные симптомы проходят после отмены препарата.

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, включая и таковые, не описанные в данном листке-вкладыше.

Противопоказания

Дети до 15 лет, повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата (аллергические реакции), фенилкетонурия, беременность, период кормления грудью, тяжелая хроническая почечная недостаточность.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не описаны.

В случае передозировки рекомендуется промывание желудка, симптоматическое лечение.

Меры предосторожности

Не превышать рекомендуемой дозы.

В начале лечения лицам с сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня сахара в крови.

С осторожностью следует назначать пациентам с кровотечениями, со склонностью к кровотечениям, с бронхиальной астмой.

Применение в период беременности и кормления грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу.

В связи с тем, что клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, препарат в этот период не следует применять.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Неизвестно.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Если в настоящее время или в недавнем прошлом вы принимали другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу.

Препарат улучшает усвоение тетрациклинов и уменьшает действие пенициллинов и хлорамфеникола. Терафлекс усиливает действия антиагрегантов, фибринолитиков, а также кумариновых антикоагулянтов (например, варфарина), что может вызывать повышение значений МНО (международного нормализованного отношения) и приводить к кровотечениям. На фоне приема Терафлекса снижается потребность в нестероидных противовоспалительных средствах.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

Капсулы 30, 60 и 120 штук во флаконе. Флакон вместе с листком-вкладышем помещен в коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы-заявителя/производителя, адрес:

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

Контракт Фармакал Корпорейшн,
135 Адамс Авеню, Хопог, Нью-Йорк 11788, США