

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перед употреблением лекарства следует ознакомиться с инструкцией по применению

ОДЕСТОН

Таблетки, 200 мг

Гимекромон (Нутесромоне)

Общая характеристика

Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглые, двусторонне плоские, с одной стороны выгравированы буквы „Ch”.

Состав

Одна таблетка содержит 200 мг гимекромона.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, желатин, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа: заболевания желчевыводящих путей

код АТХ: А 05 АХ 02

Фармакодинамические свойства

Гимекромон является кумариновым производным. Оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы желчевыводящих путей и сфинктера Одди, увеличивает образование желчи и стимулирует ее выделение желчными путями. Это действие уменьшает застой желчи и связанные с этим симптомы, а также предупреждает образование холестериновых отложений и желчных камней.

Показания

- Вспомогательное симптоматическое лечение спастических состояний желчевыводящих путей, дискинезий, диспепсических расстройств,
- функциональные нарушения желчевыводящих путей у пациентов с неосложненной желчнокаменной болезнью,
- состояния после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчевыводящих путях, а также при анорексии, тошноте и запорах, связанных со сниженным выделением желчи.

Способ применения и дозировка

Внутрь, за 30 минут до еды; взрослым – по 200-400 мг три раза в день. Курс лечения 2 недели.

Таблетки не следует делить пополам.

Побочное действие

Одестон в общем хорошо переносится. Может развиваться диарея, появиться чувство дискомфорта в животе, реакции повышенной чувствительности.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к гимекромону или какому-либо другому компоненту препарата,
- если у пациента диагностирована непроходимость желчевыводящих путей;
- если у пациента диагностирована тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;
- у пациентов с неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона.

Передозировка

Отсутствуют данные о передозировке препаратом.

В случае приема большей дозы лекарственного препарата, чем рекомендуемая, следует безотлагательно обратиться к врачу или фармацевту.

Меры предосторожности

В случае появления симптомов почечной и/или печеночной недостаточности следует прекратить прием лекарственного препарата.

Применение у беременных и кормящих грудью женщин

Перед применением лекарственного препарата следует обратиться к врачу.

Отсутствуют данные о безопасности применения препарата в период беременности.

Отсутствуют данные о безопасности применения препарата в период грудного вскармливания. Не рекомендуется применять лекарственный препарат в период кормления грудью.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов

Лекарственный препарат не вызывает ухудшения психофизической работоспособности, способности к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

- Морфин ослабляет действие гимекромона.
- Во время применения гимекромона одновременно с метоклопрамидом происходит снижение действия обоих лекарственных препаратов.

Пропуск приема препарата

Следует немедленно принять пропущенную дозу препарата.

Не следует принимать двойную дозу с целью восполнения пропущенной дозы.

Условия и срок хранения

Хранить при температуре до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности.

Статус отпуска лекарсва из аптек

Без рецепта.

Упаковка

50 таблеток.

Таблетки упакованы в блистеры из ПВХ/Ал в картонной пачке с инструкцией по применению.

Производитель

Пабяницкий фармацевтический завод Польша АО

ул. марш. Пилсудского 5

95-200 Пабянице, Польша