

Инструкция по применению препарата

«КокарБевит» (CocarBevit)

Торговое название препарата:

КокарБевит
CocarBevit

Состав:

Каждая ампула препарата содержит 10 мг динатрия аденоциантифосфат тригидрата (АТФ), 50 мг кокарбоксилазы, 500 мкг цианокобаламина (витамин В12) и 20 мг никотинамида в виде лиофилизированного порошка;
каждая ампула растворителя содержит 10 мг лидокаина в виде 2 мл 0,5% раствора гидрохлорида.
Вспомогательные вещества: глицин, метилпираидоксивензоат

Лекарственная форма

Порошок лиофилизованный для приготовления раствора для инъекций

Код препарата по АТС: A11EX

Фармакотерапевтическая группа

Витамины и метаболические средства.

Фармакологические свойства:

АТФ расширяет систему сердечных кровеносных сосудов и улучшает кровоснабжение сердечной мышцы. Выделенная в результате разрыва высокоэнергетической фосфоэфирной связи АТФ энергия используется на энергоснабжение сердечной мышцы.

Кокарбоксилаза является коферментом, который создается в организме при фосфорилировании тиамина и оказывает регулирующее воздействие на множество функций организма. Участвует в процессе обмена веществ, особенно важную роль играет в углеводородном обмене; улучшает трофику нервной ткани; содействует нормализации функции сердечнососудистой системы.

Цианокобаламин (витамин В12) участвует в процессе трансметилирования; процессах синтеза метионина, нуклеиновой кислоты и колина; а также в формировании эритроцитов.

Витамин В12 оказывает положительный эффект на функцию нервной системы, улучшает работу головного мозга, участвует в синтезе ферментов, которые обязательны для продуцирования входящих в миelinовую оболочку липопротеинов.

Никотинамид регулирует процессы фосфорилирования, метаболизм воды и электролитов. Фармакологическое воздействие никотинамида на сердечнососудистую систему обусловлено его сосудорасширяющим эффектом.

Показания:

- невралгии различного генезиса;
- нейропатии (при сахарном диабете, пернициозной анемии);
- радикулит, люмбаго;
- миалгия, ишиалгия;
- бурситы и тендиниты.

Противопоказания:

- острый период инфаркта миокарда;
- гиперкоагуляция (в т.ч. при острых тромбозах);
- эритремия;

| | |
|--|-----------------|
| SCIENTIFIC CENTRE OF DRUG AND MEDICAL TECHNOLOGY | |
| EXPERTISE AFTER DR. SCIENTIC ERIL GABRIELYAN n JSC | |
| Expert 1 | <i>AKG</i> |
| Expert 2 | <i>65.06.15</i> |
| Applicant | <i>MC</i> |
| Date | <i>17.06.15</i> |

- эритроцитоз;
- тяжелые формы артериальной гипертензии;
- артериальная гипотония;
- острый инфаркт миокарда;
- воспалительные заболевания легких;
- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата

Побочные эффекты:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота.

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, нервное возбуждение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боли в области сердца.

Со стороны мочевыделительной системы: усиление диуреза.

Аллергические реакции: крапивница.

Местные реакции: гиперемия, зуд, отек в месте введения.

При развитии выраженных побочных явлений препарат отменяют.

Способ применения и дозы:

Раствор препарата изготавливают непосредственно перед применением и незамедлительно вводят глубоко в мышцу!

Дозирование: 1 или 2 ампулы препарата ежедневно или через день по назначению врача.

Длительность лечения и проведение повторных курсов зависят от характера и тяжести заболевания.

Особые указания:

Препарат не используется, если у свежеприготовленного раствора нет красного цвета. При изменении цвета раствора не следует использовать препарат.

Раствор необходимо использовать сразу после его приготовления.

Препарат содержит метилпарабен, который может вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа) и, в исключительных случаях, бронхоспазм.

Передозировка:

Симптомы: усиление побочных эффектов препарата.

Лечение: отмена препарата. Проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Кокарбоксилаза усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов. Никотинамид и динатрия аденоэозинтрифосфат тригидрат — усиливают действие вазодилататоров.

Не рекомендуется вводить совместно (в одном шприце) витамины В1, В6, В12, т.к. содержащийся в молекуле цианокобаламина ион кобальта способствует разрушению других витаминов.

Необходимо так же учитывать, что витамин В12 может усиливать аллергические реакции, вызываемые витамином В1.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности КокарБевит следует применять только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Рекомендуется прекратить грудное вскармливание на время лечения препаратом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых на фоне применения препарата КокарБевит появляется головокружение, головная боль, не следует заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте!

| | |
|-----------|-----------|
| Expert 1 | 15.06.15. |
| Expert 2 | 15.06.15. |
| Applicant | |
| 17.06.15. | |

Форма выпуска:

Каждая коробка содержит 3 ампулы лиофилизированного препарата (объемом 2 мл) и 3 ампулы раствора (2 мл 0,5% лидокаинового раствора гидрохлорида).

Срок годности: 3 года

Условия отпуска: по рецепту

Производитель:

АО «Биофарм», Грузия, Тбилиси, ул. Гогуа № 3

Владелец регистрационного удостоверения:

АО «Джи-Пи-Си» (JSC «GPC»)

Грузия, Тбилиси, ул. Сапарии № 6,
Тел.: +995 32 95 28 02; +995 32 94 07 40

| | |
|--|--|
| «SCIENTIFIC COMPANY OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL TECHNOLOGY | |
| EXPERIMENTAL PHARMACEUTICAL COMPANY LLC GABRIELIAN JSC | |
| Expert 1 |  |
| Expert 2 |  |
| Date | 15.06.15. |
| Approval |  |
| Date | 17.06.15. |