



## Инструкция по медицинскому применению препарата

# ДИСФЛАТИЛ (DISFLATYL®)

(информация для пациентов)

**МЕДА**

**Торговое название препарата:** Дисфлатил (Disflatyl®)

**Международное непатентованное название:** Симетикон

**Лекарственная форма:** капли для приема внутрь

Однородная молочно-белая эмульсия.

### Состав

*действующее вещество:* симетикон;

1 мл препарата содержит симетикона 40 мг, в 1 мл 27 ± 3 капли;  
*вспомогательные вещества:* кислота бензойная (E210), натрия бензоат (E211), натрия сахаринат, ароматизатор ананасовый, макрогола стеариловый эфир (2), макрогола стеариловый эфир (20), вода для инъекций.

### Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных нарушениях кишечника. Силиконы.

### Код препарата по АТХ A03A X13.

### Фармакологические свойства

Активный компонент препарата **Дисфлатил** – симетикон – представляет собой нетоксичное кремнийсодержащее соединение, обладающее поверхностной активностью и пеногасящими свойствами.

Симетикон разрушает пузырьки газа физическим путем, изменяя их поверхностное натяжение и, тем самым, заставляя их спадаться. Благодаря данному свойству симетикон используется при симптоматическом лечении избыточного газообразования в области желудочно-кишечного тракта. Высвобождаемый газ затем выводится естественным способом.

Благодаря своим физико-химическим свойствам симетикон является химически и физиологически инертным веществом, нетоксичным и не абсорбируемым мембраной клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

### Показания к применению

**Дисфлатил** капли применяются для симптоматического лечения всех типов избыточного газообразования и скопления газов в желудочно-кишечном тракте: пучение, вздутие живота, метеоризм, в том числе – послеоперационный метеоризм, аэрофагия. Применение **Дисфлатила** каплей уменьшает чувство переполнения и ощущение напряжения в животе.

По назначению врача **Дисфлатил** капли применяется для подготовки к эндоскопическим, рентгенологическим, ультразвуковым, сонографическим исследованиям желудка и/или кишечника для вывода газов и воздуха из желудочно-кишечного тракта.

### Противопоказания

Непроходимость кишечника и обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

### Способ применения и дозы

**1. Симптоматическое лечение всех типов избыточного газообразования и скопления газов в желудочно-кишечном тракте**

*Взрослые:* по 25-50 капель, по возможности, сопровождая прием каплей небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном.

*Дети в возрасте от 6 до 15 лет:* по 15-20 капель, по возможности, сопровождая прием каплей небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном.

*Младенцы и дети до 6 лет:* по 10-15 капель 2-3 раза в день во время еды или после еды.

**2. Профилактический прием при подготовке к исследованию желудка и/или кишечника.**

По 50 капель 3-4 раза в день в течение 2 дней, предшествующих исследованию, 50 капель утром, натощак в день исследования и 50 капель непосредственно перед исследованием.

**Перед употреблением флакон с каплями необходимо хорошо встряхнуть!**

### Побочное действие

Поскольку активный компонент **Дисфлатила** каплей – симетикон – не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и выводится из организма в неизменном виде, препарат считается безопасным и не оказывает побочных эффектов.

56C12035030-01





В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата: сыпь на коже, зуд, гиперемия.

#### **Передозировка**

До настоящего времени неизвестны случаи применения чрезмерной дозы препарата.

#### **Особые указания**

*Прием Дисфлатила каплей больными диабетом.*

**Дисфлатил** капли не содержит сахара. Препарат содержит синтетический подсластитель – натрия сахаринат. Поэтому препарат может применяться больными диабетом.

*Прием Дисфлатила каплей при беременности и в период кормления грудью.*

Специальные исследования ни на людях, ни на животных не проводились.

Поскольку активный компонент препарата – симетикон – не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и выводится в неизменном виде, то применение **Дисфлатила** каплей во время беременности не оказывает влияние на развитие плода; в период кормления грудью препарат не проникает в материнское молоко.

*Прием Дисфлатила каплей при работе с механизмами и вождении автотранспорта.*

Препарат не оказывает системного воздействия на организм и может применяться при вождении автотранспорта и при работе с механизмами.

*Применение Дисфлатила в педиатрии*

Препарат применяется в педиатрической практике.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся сильными коликами и рвотой, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и продуктами питания**

Не требуется особых мер предосторожности при применении **Дисфлатила** капли одновременно с другими лекарственными средствами, равно как – продуктами питания, включая чай, кофе, алкогольные напитки.

#### **Форма выпуска**

По 30 мл во флаконы оранжевого стекла с дозатором. Флакон вместе с инструкцией по применению помещается в картонную коробку.

#### **Срок годности**

5 лет с момента производства. Не следует использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше +25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

*Обо всех случаях необычных реакций, связанных с применением препарата, необходимо информировать по электронному адресу представителя заявителя ([info.safety@meda-cis.com](mailto:info.safety@meda-cis.com)).*

**«МЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС ШВЕЙЦАРИЯ ГмбХ», ШВЕЙЦАРИЯ  
Хегнауштрассе 60, 8602 Ванген-Брюттисселлен, Швейцария  
(«MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH», Switzerland,  
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Bruttisellen, Switzerland)**

Произведено:

**«ЛЕГАСИ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ШВЕЙЦАРИЯ ГмбХ», ШВЕЙЦАРИЯ  
Рюрбергштрассе, 21, 4127, Бирсфельден, Швейцария  
(«Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH», Switzerland,  
Ruhrbergstrasse 21, 4127 Birsfelden, Switzerland)**

**МЕДА**



60001128B  
56C12035030-01

Studio Oberländer GmbH · Rubensstr. 33 · 60596 Frankfurt a. M. · Germany  
Phone: +49 69 631520-85 · Fax: -87 · E-Mail: info@studio-oberlaender.de

**SPECIFICATION BOX: Leaflet**

**MEDA**

**MANUFACTURER:** Meda Pharma GmbH & Co. KG

**COLOURS USED:**

**PRODUCT:** Disflatyl

 Black

ДИСФЛАТИЛ

**MEDA-NO.:** 56CI2035030-01

**MFS-NO.:** 60001128B

**LAETUS-CODE:** 758

**COUNTRY:** CIS

**LANGUAGE:** Russian

**PACK SIZE:** 210 x 148 mm

**CORRECTION:** 3.

**FONT SIZE:** 8,5 pt / 9,0 pt

**DATE:** 03. 07. 2017



Laetus 758