

1.3.1	Xylometazoline + Dexpanthenol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

**Листок-вкладыш
Информация для пациентов**

**СептаНазал® для взрослых 1 мг / 50 мг в 1 мл назального спрея
Ксилометазолина гидрохлорид / Декспантенол**

Торговое название

СептаНазал® для взрослых (SeptaNazal® for adults)

Международное непатентованное название

Xylometazoline / Dexpanthenol

Ксилометазолин / Декспантенол

Лекарственная форма

Спрей назальный, дозированный

Описание

Прозрачная, бесцветная жидкость.

Состав

1 мл назального спрея содержит 1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 50 мг декспантенола. 1 доза при однократном нажатии составляет 0,1 мл назального спрея и содержит 0,1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 5,0 мг декспантенола.

Вспомогательные вещества: калия дигидрофосфат, динатрия фосфат додекагидрат, вода очищенная.

Код классификации лекарственного средства

Комбинации симпатомиметиков, исключая кортикоステроиды.

Код АТХ: R01AB06.

Фармакологические свойства

СептаНазал® для взрослых - назальный спрей, содержащий активные вещества ксилометазолина гидрохлорид и декспантенол.

Ксилометазолина гидрохлорид обладает сосудосуживающим эффектом, устраняя, таким образом, отек слизистой оболочки носа. Декспантенол – витамин группы В, производное пантотеновой кислоты, оказывает защитное действие и способствует заживлению повреждений слизистой оболочки.

Показания к применению

Препарат рекомендован:

- для уменьшения отека слизистой оболочки носа при острой



1.3.1	Xylometazoline + Dexpanthenol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

- респираторных заболеваниях с симптомами ринита (насморка),
- в качестве поддерживающего лечения для заживления повреждений слизистой оболочки носа,
 - для облегчения состояния при вазомоторном рините,
 - для восстановления дыхания в носовой полости после хирургического вмешательства.

Препарат推薦ован детям с 6 лет и взрослым.

Способ применения и дозировка

Интаназально.

Дети старше 6 лет - одно впрыскивание СептаНазал® для взрослых в каждый носовой ход, до 3 раз в день.

Детям младше 6 лет рекомендован назальный спрей СептаНазал® для детей, содержащий меньшую дозу действующего вещества.


Взрослые - одно впрыскивание СептаНазал® для взрослых в каждый носовой ход, до 3 раз в день.

Дозирование зависит от индивидуальной чувствительности и клинической эффективности.


Способ применения

Снять защитный колпачок с распылителя.

Перед первым применением, а также, если спреем не пользовались в течение длительного периода времени, следует несколько раз нажать на распылитель до появления оптимального потока.



Верхнюю часть (наконечник) распылителя следует ввести в как можно более вертикальном положении в носовой ход и однократно нажать на распылитель. В момент впрыскивания пациенту следует произвести легкий вдох через нос. При необходимости процедуру следует повторить с другим носовым ходом.



SCIENTIFIC CENTRE OF DRUG AND MEDICAL TECHNOLOGY	
EXPERTISS APPROVED: GABRIELYAN LILY GABRIELYAN JSC	
Expert 1	
Expert 2	
Date	06.07.18
Applicant	
Date	14.07.18

1.3.1	Xylometazoline + Dexpanthenol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

После каждого применения наконечник распылителя следует протереть бумажной салфеткой и закрыть колпачком.

Если Вам понадобились дополнительная информация или совет, обратитесь к врачу или фармацевту.

Побочное действие

Подобно любому лекарственному средству в единичных случаях препарат может вызывать побочные эффекты.

Нечасто: реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, зуд, отек кожи и слизистых оболочек).

Редко: сердцебиение, тахикардия, гипертензия.

Очень редко: возбужденное состояние, бессонница, повышенная утомляемость, головная боль, галлюцинации (главным образом, у детей); аритмия; отек слизистой оболочки носа (после прекращения лечения), носовое кровотечение; судороги (преимущественно у детей).

Частота неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным): жжение и сухость слизистой оболочки носа, чихание.

При появлении побочных реакций, в том числе, не указанных в листке-вкладыше, пожалуйста, обратитесь к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ препарата.

Сухое воспаление слизистой оболочки носа.

Хирургическое удаление гипофиза или другие хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе).

СептаНазал® для взрослых противопоказан детям младше 6 лет.

Передозировка

При применении интраназально системное воздействие маловероятно, поскольку местное сужение просвета кровеносных сосудов приводит к снижению абсорбции.

В случае превышения рекомендуемых доз или случайного приема перорально (внутрь) больших количеств препарата возможны следующие нежелательные эффекты: сужение зрачков (миоз), расширение зрачков (мидриаз), лихорадочное состояние, повышенное потоотделение, бледность кожных покровов, синюшная окраска губ (цианоз), тошнота, судороги, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, респираторные нарушения, психические расстройства.

Кроме того, в случае превышения рекомендуемых доз или случайного приема перорально (внутрь) больших количеств препарата возможны сонливость, понижение температуры тела, снижение артериального давления, остановка дыхания и кома.

1.3.1	Xylometazoline + Dexpanthenol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

При появлении любого из перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед применением следует проконсультироваться с врачом:

- если пациент получает терапию ингибиторами моноаминооксидазы (ИМАО) и другими препаратами, потенциально повышающими артериальное давление,
- при повышенном внутриглазном давлении (глаукома), особенно при закрытоугольной глаукоме,
- при тяжелых заболеваниях сердца и органов кровообращения (например, коронарная болезнь сердца, повышенное артериальное давление),
- при феохромоцитоме,
- при нарушениях обмена веществ (например, гипертиреоидизм, диабет),
- при порфирии,
- при гиперплазии простаты.

Применение препарата в случае хронического ринита возможно только под наблюдением врача, поскольку существует вероятность развития атрофии слизистой оболочки носа.

Длительное применение и передозировка противоотёчных симпатомиметиков могут способствовать развитию реактивной гиперемии слизистой оболочки носа. Подобный эффект может приводить к сужению дыхательных путей, что в свою очередь вынуждает пациента повторно использовать препарат вплоть до постоянного применения, с последующим хроническим отеком или атрофией слизистой оболочки носа.

В менее тяжелых случаях для поддержания, по крайней мере, частичного носового дыхания следует прекратить введение симпатомиметика сначала в один носовой ход, а после уменьшения симптомов произвести аналогичные изменения с другим носовым ходом.


Следует избегать попадания препарата в глаза.

Применение у детей

Не следует превышать рекомендуемые дозы. Рекомендовано проконсультироваться с врачом относительно продолжительности терапии и особенностей дозирования у детей.

При отсутствии иных указаний со стороны лечащего врача, продолжительность терапии составляет до 7 дней. Повторный курс возможен после перерыва в несколько дней.

Применение препарата у детей младше 12 лет должно проходить под наблюдением взрослых.



1.3.1	Xylometazoline + Dexpanthenol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

Если после 3 дней лечения улучшения состояния ребенка не наблюдается, или ребенок чувствует себя хуже, следует проконсультироваться с врачом.

Беременность и период лактации

В период беременности и лактации перед приемом каких-либо препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Не рекомендовано применять препарат в период беременности в связи с отсутствием достаточного количества данных по безопасности.

Не рекомендовано применять препарат в период лактации, поскольку неизвестно, выделяется ли ксилометазолина гидрохлорид в грудное молоко.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

При применении в соответствии с рекомендациями препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и работать со сложными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Перед началом приёма необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства.

Сопутствующее применение препаратов для лечения депрессии (ингибиторов моноаминоксидазы транилципроминового типа или трициклических антидепрессантов), а также препаратов, повышающих артериальное давление, может привести к повышению артериального давления.

При одновременном применении с лекарственными средствами для лечения гриппа, а также симпатомиметиками, содержащимися в средствах от насморка и кашля (например, псевдоэфедрин, эфедрин, фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин, трамазолин, нафазолин, туаминогептан), возможно влияние на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.

Условия и срок хранения

До вскрытия флакона


Не требует особых условий хранения.

После вскрытия флакона

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года



1.3.1	Xylometazoline + Dexpanthenol
SPC, Labeling and Package Leaflet	AM

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 3 месяцев.

Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

Пластиковый флакон (ПЭВП) белого цвета с помпой белого цвета и полупрозрачным пластиковым колпачком: 10 мл назального спрея в коробке с листком-вкладышем. 10 мл назального спрея соответствуют 100 распылениям.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

Владелец регистрационного удостоверения

КРКА, д.д., Ново место, Шмарешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

