

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
Аллохол
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Аллохол

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав на одну таблетку

Желчь крупного рогатого скота - 80 мг
Чеснока посевного луковицы - 40 мг
Крапивы двудомной листья - 5 мг
Активированный уголь - 25 мг.

Вспомогательные вещества:

ядро: крахмал картофельный - 34,25 мг, магния оксид - 10,25 мг, тальк - 5,25 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 8,25 мг, кальция стеарат - 2,00 мг;

оболочка:

VIVACOAT PM-2P-050 - 21,00 мг

[гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) (E 464) - 10,500 мг, титана диоксид - 5,540 мг, тальк - 2,100 мг, макрогол-3350 (полиэтиленгликоль-3350) - 1,050 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,050 мг, краситель солнечный закат желтый (E 110) - 0,025 мг, краситель хинолиновый желтый (E 104) - 0,430 мг, краситель железа оксид желтый (E 172) - 0,305 мг];

ОПАДРАЙ II 85F19250 прозрачный (OPADRY II 85F19250 Clear) - 2,0 мг

[поливиниловый спирт - 1,045 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) - 0,295 мг, тальк - 0,600 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,060 мг].

Описание

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до желтого цвета, круглые, двояковыпуклые. На поперечном срезе серовато-черного цвета, допускаются светлые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТС: A05AX.

Фармакологические свойства

Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике. Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению

Хронический реактивный гепатит, холангит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, атонические запоры, постхолецистэктомический синдром.

Противопоказания

Гиперчувствительность, калькулезный холецистит, обтурационная желтуха, острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, острый панкреатит. Детский возраст до 7 лет (для данной лекарственной формы).

С осторожностью

Беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Внутри, после еды, по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки, в течение 3-4 недель.

При обострении – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки в течение 1-2 месяцев.

Детям старше 7 лет - по 1 таблетки 3 раза в день в течение 3-4 недель.

Побочное действие

Диарея, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный прием нецелесообразен.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятиям другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

1 контурную ячейковую. упаковку по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии потребителей

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru