

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

### TRIBESTAN® 250 mg film-coated tablets

### ТРИБЕСТАН 250 мг

#### таблетки, покрытые оболочкой

*Tribulus terrestris herba extractum siccum*

**Прочтите внимательно весь текст листка-вкладыша, так как он содержит важную для Вас информацию.**

Этот лекарственный препарат отпускается по рецепту врача. Для того, чтобы получить самые хорошие результаты лечения, Вы должны тщательно соблюдать инструкции к применению лекарственного препарата.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, обратитесь к Вашему фармацевту.
- Вы должны обратиться за помощью к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не улучшаются.
- Если любое из побочных действий становится серьезным или заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

#### 1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРИБЕСТАН

Трибестан является растительным препаратом, который содержит сухой экстракт надземной части растения *Tribulus terrestris* (якорцы стелющиеся).

Трибестан стимулирует функции половой системы, повышает либидо, увеличивает силу и продолжительность эрекции, благоприятно влияет на обмен липидов, обладает балансирующим гормонов действием и у женщин облегчает климактерические симптомы.

Трибестан используется в комплексном лечении пониженного либидо, импотенции (половая слабость), бесплодия у мужчин; при дислипидопроteinемии (нарушении обмена жиров) для уменьшения общего холестерина и липопротеинов низкой плотности; у женщин с климактерическим и посткастрационным синдромом (состояние после оперативного удаления яичников) для облегчения нейровегетативных и психических проявлений.

Трибестан можно применять как общетонизирующее средство при физической и психической нагрузке и для более быстрого восстановления после тяжелых заболеваний

#### 2. ПЕРЕД ПРИЕМОМ ТРИБЕСТАН

##### Не принимайте Трибестан

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или любому из вспомогательных веществ;
- при тяжелом сердечно-сосудистом или почечном заболевании;
- при аденоме предстательной железы;
- если Вы моложе 16 лет;
- Трибестан не применяется во время беременности или в период грудного вскармливания.

##### Обратите особое внимание при применении Трибестан

При лечении женщин с климактерическим синдромом переход с лечебной на поддерживающую дозу должен быть постепенным. После резкого понижения или отмены эффективной дозы возможно вторичное появление климактерических симптомов.

##### Прием других лекарств

**Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарства, включительно такие, которые отпускаются без рецепта.**

Одновременное применение Трибестан с лекарственными препаратами, стимулирующими овуляцию, ведет к взаимному усилению их эффектов.

Применение Трибестан может усилить эффекты диуретиков (мочегонных лекарств) и антигипертензивных препаратов (для лечения повышенного давления крови).

##### Беременность и грудное вскармливание

**Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед тем, как применять любое лекарство во время беременности.**

Трибестан не следует применять во время беременности и в период грудного вскармливания. При установлении беременности прием препарата следует прекратить.

##### Вождение транспортных средств и работа с машинами

Трибестан не влияет на активное внимание и его могут использовать водители и операторы машин.

#### 3. КАК ПРИНИМАТЬ ТРИБЕСТАН

Принимайте Трибестан, как описано в этом листке-вкладыше. Если Вы в чем-то не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта. Таблетки принимают внутрь, после еды.

##### При пониженном либидо, импотенции и бесплодии:

У мужчин с пониженным либидо, импотенцией и бесплодием рекомендуется дозировка по 1-2 таблеткам 3 раза в день. Продолжительность лечения - не менее 90 дней. Курс лечения можно повторять до получения удовлетворительного лечебного эффекта.

У женщин с бесплодием рекомендуется дозировка по 1-2 та-

блеткам 3 раза в день, с 1-ого до 12-ого дня менструального цикла. Этот курс можно повторять периодически до наступления беременности.

**Дислипотеинемия:** По 2 таблеткам 3 раза в день.

Продолжительность лечения - не менее 3 месяцев.

**Климактерический и посткастрационный синдром у женщин:**

По 1-2 таблеткам 3 раза в день в течение 60-90 дней. После улучшения состояния постепенно переходят к поддерживающей дозе - по 2 таблеткам в сутки в течение 1-2 лет.

**Как общетонизирующее средство:**

По 1-2 таблеткам 3 раза в день.

**Если Вы приняли большею, чем необходимо, дозу Трибестан**

До сих пор не наблюдались случаи передозировки Трибестан. При приеме большего количества препарата, обратитесь за советом к врачу. При необходимости проводится промывание желудка и симптоматическое лечение.

**Если Вы пропустили принять Трибестан**

Не принимайте двойную дозу для компенсации забытой.

**Если у Вас появятся любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого препарата, просим обратиться к Вашему врачу или фармацевту.**

#### 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все другие лекарственные средства, Трибестан может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они не проявляются у каждого.

У предрасположенных пациентов могут появиться реакции гиперчувствительности. Препарат может оказать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

**Если любое из побочных действий становится серьезным или вы заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.**

#### 5. ХРАНЕНИЕ ТРИБЕСТАН

В оригинальной упаковке в сухом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Лекарство не следует использовать после истечения срока годности, отмеченного на упаковке.

Лекарства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер с домашними отходами. Спросите у Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

#### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Что содержит Трибестан**

● Активная составная часть - Якорцев стелющихся травы экстракт сухой (*Tribulus terrestris herba extractum siccum* (35-45:1) 250 мг (содержание фурастаноловых сапонинов не менее 112,5 мг).

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; кремния диоксид коллоидный, безводный; повидон К 25; кросповидон; магния стеарат; тальк.

Состав пленочного покрытия: опадрай АМВ коричневый (Polyvinyl alcohol-part. hydrolyzed, тальк, E171, E172, E322, E415).

**Как выглядит Трибестан и что содержится в упаковке**

Таблетки, покрытые оболочкой - круглые, двояковыпуклые, коричневого цвета, диаметром 13 мм, запах - специфический. 10 таблеток, покрытых оболочкой, в блистере из твердой, бесцветной, прозрачной ПВХ пленки/алюминиевой фольги; 6 блистеров в картонной пачке, вместе с листком-вкладышем.

**Условия отпуска**

По рецепту врача

**Владелец торговой лицензии и производитель**

АО СОФАРМА

ул. Илиевское шоссе 16

1220 София, Болгария

**Дата последнего пересмотра листка-вкладыша:** декабрь 2008

РЕГ. № N9837