

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ЛИВАРОЛ®

Регистрационный номер: Р N002290/01

Торговое название препарата Ливарол®

Международное непатентованное название Кетоконазол

Лекарственная форма Суппозитории вагинальные.

Описание

Суппозитории белого, белого с желтоватым или сероватым, или с кремоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

Состав

Один суппозиторий вагинальный содержит:

Действующее вещество: кетоконазол - 400 мг;

Вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол - 0,5 мг; основа для суппозиториев: макрол - 1500 (92 - 98) %, макрол - 400 (8 - 2) % - до получения суппозитория массой 3,0 г.

Фармакотерапевтическая группа

Противогрибковое средство

Код ATХ: G01AF11.

Фармакологические свойства

Активное вещество - кетоконазол, производное имидазолдиоксолана. Оказывает фунгицидное и фунгистатическое действие в отношении дерматофитов (*Trichophyton spp.*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum spp.*) и дрожжей (*Candida spp.*, *Pityrosporum spp.*). Механизм действия заключается в угнетении биосинтеза эргостерола и изменении липидного состава мембранны грибов.

Препарат активен в отношении стафилококков и стрептококков.

Фармакокинетика

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.


Показания к применению

Лечение острого и хронического рецидивирующего вагинального кандидоза.

Профилактика возникновения грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на фоне лечения антибактериальными средствами и другими препаратами, нарушающими нормальную микрофлору влагалища.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 18 лет.



Беременность (I триместр).

С осторожностью

Беременность (II - III триместр), лактация.

Способ применения и дозы

Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки, вводят его глубоко во влагалище в положении лежа на спине по 1 суппозиторию в сутки в течение 3 - 5 дней в зависимости от течения заболевания. При хроническом кандидозе применяют по 1 суппозиторию 10 дней.

Побочное действие

Гиперемия и раздражение слизистой оболочки влагалища, зуд влагалища. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При применении Ливарола® суппозитории вагинальные 400 мг, отрицательные взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны и их не следует ожидать, так как резорбционная способность кетоконазола низкая.

Особые указания

В редких случаях возможны аллергические реакции (гиперемия полового члена) у полового партнера.

Для снижения риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Форма выпуска

Ливарол® суппозитории вагинальные 400 мг. 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.


Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.



Изготовитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

Претензии потребителей направлять по адресу:


603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел.: (831) 278 80 88

факс: (831) 430 72 28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Как уменьшить опасность повторного развития инфекции:

- Отдавайте предпочтение свободной «дышащей» одежде и нижнему белью из хлопка.
- Не ходите долго в мокром купальнике. Теплая влажная среда благоприятствует развитию грибков.
- Пользуйтесь только личным полотенцем. Влажные полотенца могут сохранять инфекцию.
- Вытирайтесь движениями спереди назад, чтобы избежать заноса бактерий из области ануса во влагалище.
- Избегайте использования масла для ванны, женских гигиенических спреев и пудр, которые могут раздражать кожу вокруг вульвы.
- Не ешьте слишком много сладкого, это может изменить pH влагалища и создать условия для активизации грибка.
- Каждый день употребляйте в пищу кисло-молочные продукты, содержащие лактобактерии.
- Всегда имейте под рукой противогрибковое средство на тот случай, если Вам надо будет принять антибиотик в связи с другим заболеванием.
- Воздерживайтесь от половых сношений во время лечения грибковой инфекции.


Преимущества лечения суппозиториями вагинальными Ливарол®:

- Быстрота действия, обусловленная введением лекарственного вещества непосредственно в очаг воспаления.
- Выраженный эффект, связанный с созданием высокой концентрации активного вещества во влагалище.
- Минимальное количество побочных эффектов (всасывание препарата при местном применении минимально).
- Удобство применения.
- Излечение в короткие сроки (3-5 дней).

Способ применения:

- Извлеките суппозиторий из контурной упаковки как показано на рисунке (контурная ячейная упаковка снабжена специальными «крыльшками» для каждого суппозитория, которые позволяют Вам ~~легко и~~ быстро извлечь суппозиторий, не повредив его).





- Введите суппозиторий глубоко во влагалище в положении лежа на спине.
- Не прерывайте курс лечения самостоятельно, даже если беспокоящие Вас симптомы исчезли, так как незавершенное лечение может привести к переходу заболевания в хроническую форму.

