

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Ангиноваг**

Торговое название
Ангиноваг

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма
Спрей для местного применения

Состав

100 мл препарата содержат

активные вещества:

деквалиния хлорид 0.1 г, тиротрицин 0.4 г, β-глицирретовая кислота 0.06 г, гидрокортизона ацетат 0.06 г, лидокаина гидрохлорид 0.1 г,

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, масло ананасовое, натрия сахаринат, этанол 96 %.

Описание

Прозрачный, бесцветный или светло-желтый раствор с характерным вкусом и запахом ананаса.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Препараты для лечения заболеваний горла.

Код ATX R02A.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Препарат предназначен для ингаляционного применения и образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления.



Фармакодинамика

Ангиноваг объединяет в своем составе вещества противовоспалительного, анальгетического, антибактериального, антисептического и противовирусного действия. Объединение указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости. Препарат представлен в форме спрея с клапаном для распыления, благодаря чему удобен для применения при лечении инфекций ротоглотки.

Показания к применению

- местное лечение при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и верхних дыхательных путей: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты, глоссит.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 13 лет.

Перед применением прополоскать рот и глотку, удалить налет с пораженных участков.

Ударная доза по 1-2 впрыскивания каждые 2-3 часа, поддерживающая – по 1 впрыскиванию каждые 6 часов. Курс лечения определяется врачом индивидуально, обычно составляет 5-7 суток.

Для правильного применения рекомендуется поместить флакон в вертикальном положении, чтобы пероральный аппликатор был направлен на зону поражения, но не полностью вводите в ротовую полость. Нажмите верхнюю часть колпачка сверху вниз. Не снимайте пероральный аппликатор с флакона после установки и применения.

Побочные действия

- аллергические реакции на компоненты препарата
- ощущение жжения, сухость
- легкое онемение.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата
- детский возраст до 13 лет.

Лекарственные взаимодействия

Не рекомендуется одновременное применение с новокаином, седативными препаратами.

Особые указания

Ангиноваг содержит 89,385 % этанола в конечном объеме. Каждое



впрыскивание содержит приблизительно 0.075 г этанола, который может являться причиной риска применения в педиатрии до 13 лет, беременных женщин и пациентов с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, повреждениями головного мозга, поэтому применять с осторожностью. Следует соблюдать осторожность при назначении больным с сахарным диабетом, так как препарат содержит сахаринат натрия.

Беременность и период лактации

Применение препарата в период беременности и лактации не противопоказано, но целесообразность приема устанавливает врач в зависимости от преимущества пользы над потенциальным риском от применения. Не превышать рекомендованные дозы.

Особенности влияния на способность управлять автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами

Учитывая содержания 0.075 г этанола необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Форма выпуска и упаковка

По 20 мл препарата помещают во флаконы белого цвета из полиэтилена высокой плотности, укупоренные полипропиленовой крышкой.

По 1 флакону вместе с насадкой и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

4 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Наименование и страна организации-производителя

Феррер Интернасиональ С.А.,

Гран Виа де Карлос III, 94 08028 Барселона, Испания.

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения

Лаборатории Новаг С. А. Испания

Наименование и страна организации-упаковщика



Феррер Интернасиональ С.А., Испания.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии потребителей по качеству продукции (товара)

Представительства «Медиал Ди энд Пи Лтд» по Центральной Азии в РК
050050 г. Алматы, тел: +7 727 295 48 82/83, факс 295 48 81.

