

ERCEFURYL® 200 mg
Nifuroxazide

Gélule

SANOFI 



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ERCEFURYL 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule
3. Comment prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ERCEFURYL 200 mg, gélule
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ERCEFURYL 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est un antibactérien intestinal.

Indication thérapeutique

Il est indiqué, en complément de la réhydratation, dans le traitement de la diarrhée aiguë d'origine infectieuse chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Le traitement ne dispense pas de mesures diététiques et d'une réhydratation si elle est nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ERCEFURYL 200 mg, gélule

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais ERCEFURYL 200 mg, gélule :

- En cas d'allergie aux dérivés du nitrofurane ou à l'un des autres constituants du produit

- Chez l'enfant de moins de 6 ans

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales
Faites attention avec ERCEFURYL 200 mg, gélule :

Mises en garde spéciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

Vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en l'absence d'amélioration au bout de 3 jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre, de vomissement,
- en cas de diarrhée supérieure à 6 selles liquides par jour ou qui dure plus de 24 heures ou qui s'accompagne d'une perte de poids
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Précautions d'emploi

Ce traitement est un complément des règles diététiques :

- **se réhydrater** par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres);
- **s'alimenter** le temps de la diarrhée,
 - en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés,
 - en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser le nifuroxazide pendant la grossesse.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants d'ERCEFURYL 200 mg, gélule :

Liste des excipients à effet notoire : saccharose.

3. COMMENT PRENDRE ERCEFURYL 200 mg, gélule

Posologie

- Chez l'adulte, 4 gélules par jour à répartir en 2 à 4 prises.
- Chez l'enfant à partir de 6 ans: 3 à 4 gélules par jour à répartir en 2 à 4 prises.

La prise de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car elle peut entraîner une fausse route. Chez l'enfant, il existe une forme pharmaceutique plus adaptée.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

Durée du traitement

La durée du traitement est limitée à 7 jours.

Si vous avez pris plus d'ERCEFURYL 200 mg, gélule que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ERCEFURYL 200 mg, gélule :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ERCEFURYL 200 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Possibilité de réactions allergiques à type d'éruption cutanée, d'urticaire, d'œdème de Quincke (brusque gonflement d'une partie du corps survenant le plus

←
SENS DE DEROULEMENT
RECTO
(Intérieur bobine)

souvent au niveau du visage, de la langue ou du cou) ou de choc anaphylactique (réaction allergique pouvant être généralisée).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ERCEFURYL 200 mg, gélule

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ERCEFURYL 200 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ERCEFURYL 200 mg, gélule

La substance active est:

Nifuroxazide.....200 mg

Pour une gélule.

Les autres composants sont:

Saccharose, amidon de maïs, stéarate de magnésium. Enveloppe de la gélule: dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), gélatine.

Qu'est-ce que ERCEFURYL 200 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 14 et 28.

Titulaire et Exploitant

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France

Fabricant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
6 Boulevard de l'Europe
21800 QUETIGNY – France

La date à laquelle cette notice a été révisée est :
Octobre 2011.

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les

infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2- Respectez strictement votre ordonnance.
- 3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5- Une fois votre traitement terminé, rappez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

ERCEFURYL® 200 mg

Nifuroxazide

Hard capsules

Read all of the leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any other questions or doubts, ask your doctor or pharmacist for further information.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What ERCEFURYL 200 mg, hard capsules are and what they are used for

2. What you need to know before you take ERCEFURYL 200 mg, hard capsules
3. How to take ERCEFURYL 200 mg, hard capsules
4. Possible side effects
5. How to store ERCEFURYL 200 mg, hard capsules
6. Contents of the pack and other information

1. WHAT ERCEFURYL 200 mg, hard capsules ARE AND WHAT THEY ARE USED FOR

Pharmacotherapeutic group

This medicine is an intestinal antibacterial agent.

Therapeutic indications

It is indicated, as a supplement to rehydration, in the treatment of acute diarrhoea of infectious origin in adults and in children aged over 6 years.

Taking this medicine does not remove the need for dietary measures, and if necessary, rehydration.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ERCEFURYL 200 mg, hard capsules

If your doctor has told you that you are intolerant to some sugars, contact him or her before taking this medicine.

Contraindications

Do not use ERCEFURYL 200 mg, hard capsules:

- if you are allergic to nitrofurans derivatives or to any of the other ingredients
- in children under 6 years of age.

IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

Precautions for use and special warnings

Take special care with ERCEFURYL 200 mg, hard capsules:

Special warnings

You should not take this medicine if you have fructose intolerance, glucose and galactose malabsorption syndrome or sucrase-isomaltase deficiency (rare hereditary diseases).

You must see a doctor quickly in the following situations:

- No improvement after 3 days of treatment,
- Onset of fever, vomiting,
- Diarrhea involving more than 6 liquid stools per day or persisting for more than 24 hours or accompanied by weight loss.
- Presence of blood or mucus in the stools,
- Intense thirst, feeling of dry tongue. These signs indicate the start of dehydration, i.e. a significant decrease in liquids due to diarrhea. Your doctor will then decide whether it is necessary to prescribe

rehydration which may be given by oral or intravenous route.

Precautions for use

This treatment is a supplement to the following dietary rules:

- rehydrate with plenty of fluids (sweet or savoury drinks), in order to compensate for fluid loss due to diarrhea (average daily water intake: 2 liters);
- maintain food intake throughout the entire episode of diarrhea,
 - excluding certain foodstuffs, especially raw vegetables, fruit, green vegetables, spicy foods, as well as iced drinks or foods.
 - giving preference to grilled meats and rice.

IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

Other medicines and Ercefuryl 200 mg, hard capsules

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Pregnancy and breast-feeding

Use of Ercefuryl (nifuroxazide) should preferably be avoided during pregnancy.

Breast-feeding is nevertheless possible with short-term nifuroxazide treatment.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving and using machines

This medicine has no effect on the ability to drive or use machines.

Important information about certain ingredients of ERCEFURYL 200 mg, hard capsules:

List of excipients with specific effects: sucrose.

3. HOW TO TAKE ERCEFURYL 200 mg, hard capsules

Dosage

- Adults: 4 capsules a day, to be divided into 2 to 4 intakes
- Children over the age of 6 years: 3 to 4 capsules a day, to be divided into 2 to 4 intakes.

Administration of capsules is contraindicated in children under 6 years of age due to the risk of choking. A more suitable pharmaceutical form is available for younger children.

Method of administration

Oral use.

Swallow the hard capsules with a glass of water.

Duration of treatment

Do not take this medicine for more than 7 days.

If you take more ERCEFURYL 200 mg, hard capsules than you should:

Consult your doctor or pharmacist immediately.

If you forget to take ERCEFURYL 200 mg, hard capsules:

Do not double the dose to make up for the one you missed.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, ERCEFURYL 200 mg, hard capsules can cause side effects, although not everybody gets them.

- Possible allergic reactions such as rash, hives, angioedema (sudden allergic swelling of a part of the body, most often the face, tongue or neck), or anaphylactic reaction (possibly generalised allergic shock).

If you notice any side effects not listed in this leaflet, or if any of the side effects become serious, please tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE ERCEFURYL 200 mg, hard capsules

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use ERCEFURYL 200 mg, hard capsules after the expiry date printed on the box.

Store at a temperature not exceeding 30°C.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist what to do with unused medicines. These measures will help protect the environment.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER information

What ERCEFURYL 200 mg, hard capsules contain

The active substance is:

Nifuroxazide.....200 mg

For one hard capsule.

The other ingredients are:

Sucrose, maize starch, magnesium stearate.

Capsule shell: titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), gelatin.

What ERCEFURYL 200 mg, hard capsules look like and contents of the pack

This medicine is a hard capsule. Box of 14 and 28.

Marketing Authorization Holder and Operating Company

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
France

Manufacturer

Sanofi Winthrop Industrie
6 Boulevard de l'Europe
21800 Quetigny
France

This leaflet was last revised in: October 2011.

HEALTH INFORMATION AND ADVICE

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT ANTIBIOTICS

Antibiotics are effective in fighting infections caused by bacteria. They are not effective against those caused by viruses.

Your doctor has therefore chosen to prescribe this antibiotic for you because it is suitable for you and for the disease you have.

Bacteria are able to survive or to reproduce despite the effect of an antibiotic. This is known as resistance and makes some antibiotic treatments ineffective.

Inappropriate or excessive use of antibiotics increases resistance.

You may promote the growth of resistant bacteria and thus slow down your recovery, or even make this medicine ineffective, if you do not comply with the following:

- prescribed dose,
- administration times,
- duration of treatment.

Therefore, to maintain the efficacy of this medicinal product:

- 1- Only use an antibiotic when your doctor has prescribed it for you.
- 2- Comply strictly with your prescription.
- 3- Do not reuse an antibiotic without a medical prescription even if you think you are fighting an apparently similar disease.
- 4- Never give your antibiotic to someone else - it may not be appropriate for their disease.
- 5- Once your treatment is completed, bring all opened boxes to your pharmacist for proper disposal of this medicine.

ERCEFURYL® 200 mg

إرسيفوريل® 200 ملغ

كيسولات صلبة

نيفوروكسازيد

اقرأ هذه النشرة بالكامل وبعيداً قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى أو متأكد من سلامة الطبيب أو الصيدلاني عن معلومات إضافية.
- قد يوصف هذا الدواء لك شخصياً ولا يجدر بك إعطاؤه لآخرين فقد يؤذيهم. حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك.
- في حال نقاهم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني.

إعادة النشرة :

1. ما هي كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ وما هي دواعي استعمالها
2. ما الذي يجب عليك أن تعرفه قبل أن تأخذ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ
3. كيف تؤخذ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. كيف تحفظ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ
6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هي كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ وما هي دواعي استعمالها

الفئة الدوائية العلاجية

هذا الدواء هو مضاد معوي للبكتيريا.

دواعي الاستعمال العلاجية

يوصف كمنقحة لمعالجة الجفاف في علاج الإسهال الحاد ذي الأصل المخجج لدى البالغين والأطفال فوق السادسة من العمر.
لا ينبغي تناول هذا الدواء الحادة إلى اعتماد حمية غذائية وإلى إعادة التمهيد عند الضرورة.

2. ما الذي يجب عليك أن تعرفه قبل أن تأخذ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ

إذا قال لك طبيبك إنك لا تتحمل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل أخذ هذا الدواء.

موانع الاستعمال

لا تستعمل كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ:

- إذا كنت مصاباً بحساسية ضد مشتقات النيوتروفوران أو ضد أي من المكونات الأخرى
- لدى الأطفال ما دون السادسة من العمر.

في حال الشك لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.

محاذير الاستعمال وتحذيرات خاصة

اعتمد رعاية خاصة مع كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ:

تحذيرات خاصة

لا ينبغي أخذ هذا الدواء إذا كنت لا تتحمل الفركتوز أو كنت مصاباً بمتلازمة سوء امتصاص الغلوكوز

والغالكتوز أو بنقص السكران-إيزومالتاز (مرض وراثية نادرة).

يجب عليك أن ترى الطبيب على الفور في الحالات التالية:

- عدم التحسن بعد 3 أيام من العلاج.
- ظهور حصى، نفثون
- براز سائل أكثر من 6 مرات في اليوم أو يوم أكثر من 24 ساعة أو يترافق مع خسارة وزن، ووجود دم أو مخاط في البراز.
- طمأ قوي وشعور بجفاف في اللسان. تعد هذه الإشارات على بداية التجفاف أي انخفاض كبير في السوائل بسبب الإسهال. سوف يفتر طبيبك ما إذا كان من الضروري وصف إعادة التمهيد التي يمكن أن تحظى عن طريق الدم أو بالمخزن داخلوريد.

محاذير الاستعمال

هذا العلاج هو تكمل للوعاء الغذائية التالية:

- أعد التمتع بواسطة الكثير من السوائل (مشروبات حلوة أو مالحه) بغية تعويض خسارة السوائل بسبب الإسهال (معدل الاستهلاك اليومي من الماء، لتران).
- وأصل تناول الطعام طيلة فترة الإسهال.
- عدم تناول بعض الأطعمة بخاصة الخضار اللينة، الفواكه اللينة، الخضار الخضراء، الأطعمة الغنية بالزواول، وكذلك المشروبات والأطعمة الملحجة.

- إعطاء الأولوية لحم الشوي والأرز.

في حال الشك لا تتردد باستشارة الطبيب أو الصيدلاني.

استعمال أدوية أخرى مع كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ

أعلم الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما فيها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

الإرضاع

يُنضَلُ خاتمة استعمال إرسيفوريل (نيفوروكسازيد) في خلال فترة الحمل.

الإرضاع يمكن مع العلاج القصير الأمد بالنيفوروكسازيد.

استشر الطبيب أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

القيادة واستعمال الآلات

لا يؤثر هذا الدواء على القدرة على القيادة أو على استعمال الآلات.

معلومات مهمة حول بعض مكونات كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ،

لائحة الأوسعة التي لها تأثيرات محددة، السكروز.

3. كيف تؤخذ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ

مقدار الجرعة

- البالغون: 4 كيسولات في اليوم، تؤخذ مرتين إلى 4 مرات
 - الأطفال فوق السادسة من العمر: من 3 إلى 4 كيسولات في اليوم، تؤخذ مرتين إلى 4 مرات في اليوم.
- يمنع إعطاء الكيسولات للأطفال ما دون السادسة من العمر بسبب خطر الاختناق. يتوافق شكل صيدلاني مناسب للأطفال مصغار.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم

إبلع الكيسولات الصلبة مع كوب من الماء.

مدة العلاج

لا تأخذ هذا الدواء لأكثر من 7 أيام.

إذا أخذت جرعة مفرطة من كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ،

استشر الطبيب أو الصيدلاني على الفور.

إذا نسيبت أخذ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ،

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة التي فوتتها.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلها، يمكن أن تسبب كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كلهم.

• إرتكاسات تحسسية: حمى، طفح، تورم الشفتين والحوالب (تورم أرجح) مفاجئ

في جزء من الجسم، في الوجه غالباً أو اللسان أو العنق)، أو ارتكاس عوراني (تحمّل الإصابة

بصدمة إرجحية شاملة).

إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة أو في حال نقاهم أحد التأثيرات الجانبية، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلاني.

5. كيف تحفظ كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ

ابق هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظّرم.

لا تستعمل كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العلبة.

إحفظ الدواء في حرارة ما دون 30 درجة مئوية.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو في النفايات المنزلية. إسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ماذا تحتوي كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ

المادة الفاعلة هي:

نيفوروكسازيد، 200 ملغ

في الكيسولة الصلبة الواحدة.

المكونات الأخرى هي،

سكروز، نشأ البرية، ستيرات المغنزيوم.

غلاف الكيسولة: خاني أكسيد التيتانيوم (إي 171)، أكسيد الحديد الأصفر (إي 172)، غلام.

كيف هو شكل كيسولات إرسيفوريل الصلبة 200 ملغ ومحتويات العلبة
هذا الدواء هو كيسولة صلبة على من 14 و 28.

الشركة حاملة رخصة التسويق والشركة المشفحة

sanofi-aventis France

1- 13, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

France

الشركة المصنعة

Sanofi Winthrop Industrie

6 Boulevard de l'Europe

21800 Quetigny

France

تاريخ المراجعة الأخيرة لهذه النشرة : تشرين الأول 2011.

معلومات / نصائح صحية

ما الذي يجب عليك معرفته حول المضاد الحيوي

إن المضادات الحيوية فعالة في مقاومة الالتهابات التي تسببها البكتيريا. وهي ليست فعالة في مقاومة

الالتهابات التي تسببها الفيروسات.

وبالتالي فقد أخفق طبيبك وصف المضاد الحيوي هذا لك لأنه يتناسب ويتناسب المرض الذي تعاني منه.

إن البكتيريا قادرة على البقاء أو على التكاثر بالرغم من مغفل مضاد حيوي. يُعرف هذا بالمقاومة

ويحصل بعض العلاجات بالمضادات الحيوية غير فعال.

إن الاستعمال غير المناسب أو المفرط للمضادات الحيوية يزيد المقاومة.

قد تتعرّض نمو البكتيريا المقاومة وتبيط بالتالي شفائه، أو حتى قد تجعل هذا الدواء غير فعال في حال لم

تتقنه بما يلي:

• الجرعة الموصوفة.

• أوقات تناول.

• مدة العلاج.

لذلك ينبغي الحفاظ على فعالية هذا الدواء:

1 - استعمال فقط مضاداً حيوياً عندما يصفه لك طبيبك.

2 - تقيده بدقة الموصوفة.

3 - لا تستعمل مجددًا مضاداً حيوياً بدون وصفة طبية حتى إن كنت تعتقد أنك تقاوم مرضاً

يبداً بماتلاً.

4 - لا تعطل أبداً مضادك الحيوي لأحد آخر. فقد لا يلائم مرضه.

5 - عند انتهاء علاجك، أخرج كل العبء المتبقية إلى الصيدلاني كي يتخلص

منها بالطريقة المناسبة.

إن هذا الدواء

مستحضر يوزع على صحتك و استهلاكه خلافا لتعليمات

بإجراءات الخطأ

تجلبت نتيجة وصفة الطبيب، بطريقة الاستعمال المنصوص عليها

وتعليمات الصيدلاني الذي وصفها لك.

• الطبيب والصيدلاني هما المختصان في الدواء، في نفعه و ضرره

• لا تطعم دواءً للعلاج المبردة لك من تلقا نفسك

• لا تترك صرف الدواء بدون إشراف الطبيب

• لا تتركه لردوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
والحداد الصيدالة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.

Do not use your reserved the period of treatment prescribed.

Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.