



“Научный центр экспертизы лекарств
и медицинских технологий” АО «МЗ РА

Директор *Топчян А.В.* Топчян А.В.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Фармакологического совета МЗ РА

Э. Амроян

Э. Амроян

“ 02 ” _____ 04 _____ 2015 г

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

ЭРИТРОМИЦИН МАЗЬ

Регистрационный номер в РА: №

Торговое название: Эритромицин мазь

Международное непатентованное название: Эритромицин (Erythromycin)

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав

Каждый грамм содержит:

активное вещество: эритромицин – 10 мг;

вспомогательные вещества: жидкий парафин, пропилпарабен, вазелин белый, этанол.

Фармакологическая группа

Антибиотик группы макролидов для наружного применения.

Код АТХ

D10AF02.

Фармакологическое действие

Антибиотик из группы макролидов, оказывающий бактериостатическое действие. При наружном применении оказывает противогрибковое действие за счет бактериостатического действия на микроорганизмы, вызывающие угревую сыпь: Propionibacterium acnes.

Обратимо связывается с 50S субъединицей рибосом, что нарушает образование пептидных связей между молекулами аминокислот и блокирует синтез белков микроорганизмов (не влияет на синтез нуклеиновых кислот).

При применении в высоких дозах в зависимости от вида возбудителя может проявлять также бактерицидное действие.

Фармакокинетика

Системной абсорбции подвергается лишь незначительная часть эритромицина, которая в дальнейшем выводится из организма с мочой.

Показания к применению

- Лечение вульгарных угрей (преимущественно папулезных и пустулезных).
- Гнойно-воспалительные заболевания кожи.

Способ применения

Мазь наносят не чаще 2 раз/сут ежедневно на предварительно очищенные пораженные участки кожи. Лечение продолжают до клинического улучшения, в среднем 1-3 мес.

Побочные реакции

Местные реакции: иногда может возникать ощущение жжения, раздражение, сухость кожи на месте нанесения препарата. Как правило, эти явления слабо выражены и не требуют отмены препарата и/или проведения симптоматической терапии

Аллергические реакции: генерализованная крапивница, раздражение, покраснение, десквамация эпидермиса, эритема кожи, раздражение глаз.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к эритромицину и другим макролидам.

Беременность и кормление грудью

Применение препарата при беременности и в период кормления грудью нежелательно и возможно только в том случае, когда предполагаемая польза превышает риск развития побочных эффектов.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и чувствительные участки кожи (веки, шея, надключичная впадина).

Применение другого противоугревого препарата для наружного применения возможно не ранее чем через час.

При появлении генерализованной крапивницы следует прекратить лечение и назначить кортикостероиды системного действия.

После каждого применения препарата следует тщательно вымыть руки.

В случае присоединения инфекции препарат следует отменить и назначить соответствующую терапию.

При применении препарата возможно развитие перекрестной резистентности к другим антибиотикам группы макролидов, линкомицину, клиндамицину.

Штаммы *Propionibacterium* становятся более резистентны к антибиотикам. Для предупреждения развития резистентности в течение лечения Эритромицином в виде мази для наружного применения больной не должен применять другие антибиотики перорального применения. Больной не должен применять препарат в течение более длительного времени, чем необходимо, тем не менее, лечение должно продолжаться не менее 6 месяцев.

Применение в педиатрии: безопасность и эффективность применения эритромицина в виде мази в педиатрии не установлена.

Передозировка

Случайная передозировка маловероятна из-за особенностей местного применения препарата.

Лекарственное взаимодействие

При одновременном применении эритромицина с лекарственными средствами, вызывающими десквамацию эпидермиса (например, бензоил пероксид, третиноин, резорцин, салициловая кислота, сера) возможно усиление побочных действий.

Одновременное применение другого местного антибактериального препарата противопоказано.

Эритромицин нельзя применять одновременно с препаратами, вызывающими десквамацию кожи, а также с косметическими и гигиеническими средствами, вызывающими сухость и раздражение кожи.

Эритромицин не следует применять одновременно с клиндамицином, поскольку они конкурентно связываются с 50S субчастицей рибосом.

Форма выпуска

1% мазь для наружного применения в тубах алюминиевых по 20 и 25 г вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 15⁰С.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача.

Производитель

ООО “АРПИМЕД”

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой микрорайон, д. 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

Владелец регистрационного удостоверения

ООО “АРПИМЕД”

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924