

# ТРАХИСАН®

Таблетки для рассасывания

## ТРАХИСАН

Таблетки

### Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать принимать данное лекарственное средство.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Дополнительную информацию или совет Вы сможете получить у Вашего врача или у Вашего фармацевта.

#### Состав:

В1 таблетке содержится:  
активные вещества: тиротрицин 0,5 мг, лидокаина гидрохлорид 1 мг, хлоргексидина диглюконат 1 мг;  
прочие ингредиенты (наполнители): сорбитол (E 420), магния стеарат, масло мятное.

#### Форма выпуска.

Таблетки для рассасывания.

#### Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла.

#### Показания

Воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки, такие как стоматиты, гингивиты, пародонтиты, глосситы, тонзиллиты, фарингиты, и другие состояния, сопровождающиеся нарушением глотания. Для профилактики инфекций перед хирургическим вмешательством на участках полости рта и глотки (экстракция зуба, тонзиллэктомия).

#### Противопоказания

Нельзя назначать при непереносимости фруктозы. Нельзя назначать при известной гиперчувствительности к какому-либо ингредиенту препарата.

#### Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени не известны.

#### Особые предостережения и особые меры предосторожности

Не рекомендовано применять препарат детям младше 4 лет, поскольку препарат необходимо рассасывать. По аналогии со всеми прочими фармацевтическими препаратами принимать Трахисан во время беременности и в периоде лактации можно только после предварительной консультации с врачом.

#### Режим дозирования и способ употребления

Принимать по 1 таблетке, рассасывая в полости рта каждые 2 часа. Суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет - 8 таблеток; для детей от 4 до 12 лет - 6 таблеток. Как правило, симптомы заболевания исчезают через несколько дней, но для достижения стабильного терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2 - 3 суток. В случае если за 5 суток применения препарата состояние пациента не улучшается, необходима консультация врача.

## Побочные действия

Обычно Трахисан хорошо переносится. Возможно появление кратковременных изменений вкуса, временное онемение языка. При длительном применении в единичных случаях возможно появление незначительной окраски в желтый или светло-коричневый цвет зубов, зубных пломб и протезов или языка, в таких случаях необходимо придерживаться тщательной гигиены полости рта. Окрашивание исчезает самостоятельно после прекращения приема препарата.

## Срок годности

3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## Хранение

Хранить при температуре не выше 25 °C в защищенном от влаги, недоступном для детей месте.

## Упаковка и содержимое

Упаковки по 20 таблеток (блестеры по 10 таблеток)

## Предприятие - производитель

Энгельхард Арцнаймиттель  
ГмбХ & Ко. КГ.  
Германия., 61138 Нидердорфэльден  
Херцбергштрассе 3