

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Фуроталгин 2,5 мг/31,25 мг/87,5 мг/мл капли ушные, раствор
Furotalgin® 2,5 mg/31,25 mg/87,5 mg/ml ear drops, solution
нитрофурал/тетракаина гидрохлорид/феназон

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш перед началом применения этого лекарства.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если у Вас появятся любые дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.
- Это лекарство назначено лично Вам. Не переуступайте его другим лицам. Оно может навредить им, независимо от того, что у них такие же симптомы, какие и у Вас.
- Если любое из побочных действий становится серьезным или заметите другие, неописанные в этом листке-вкладыше, просим уведомить об этом Вашего врача.

В этом листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Фуроталгин и для чего применяется
2. Перед тем, как использовать Фуроталгин
3. Как применять Фуроталгин
4. Возможные побочные действия
5. Хранение Фуроталгин
6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФУРОТАЛГИН И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Фуроталгин - комбинированный лекарственный препарат с противомикробным, противовоспалительным и болеутоляющим действием. Применяется при острых воспалительных процессах слухового прохода и среднего уха у взрослых и детей.

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУРОТАЛГИН

Не используйте Фуроталгин

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на активные вещества (нитрофурал, тетракаин, феназон) или на вспомогательное вещество.
- лечащий врач не назначит Вам Фуроталгин, если у Вас прободение барабанной перепонки или инфекция уха, вызванная грибками (отомикоз).

Употребление других лекарственных средств

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарства, включительно и отпускаемые без рецепта.

Беременность и грудное вскармливание

Фуроталгин можно назначать беременным и кормящим грудью женщинам после оценки врачом.

EXPERISE AFTER ACADEMIC EMIL GABRIELIAN JS
EXPERT 1
EXPERT 2
Date 11.03.16
Analisti
Date 11.03.2016

Если Вы беременны, обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарства.

Управление транспортными средствами и работа с машинами

Фуроталгин не влияет на способность водить транспортные средства и работать с техникой или машинами.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ФУРОТАЛГИН

Всегда используйте Фуроталгин в точности так, как назначил Ваш врач. Если Вы в чем-то не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Фуроталгин – лекарственный препарат, предназначенный для закапывания в уши. Не закапывать в нос и глаза! Не принимать внутрь!

Используйте капли после очищения слухового прохода. Голову следует склонить набок таким образом, чтобы капли остались в ухе в течение нескольких минут, после чего слуховой проход закрывают ватой. Необходимо предварительно подогреть раствор до температуры тела, чтобы избежать неприятного контакта с холодными каплями.

Дозировка:

Взрослые и дети старше 3-летнего возраста: по 6-10 капель 3-4 раза в день;

Дети до 3-летнего возраста: по 3-4 капли 2 раза в день.

Продолжительность лечения: устанавливается лечащим врачом. Не должно продолжаться более 10 дней.

Если Вы применили дозу Фуроталгин, превышающую необходимую

Нет сообщений о случаях передозировки при правильном применении Фуроталгин.

Если Вы пропустили применение Фуроталгин

Не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной.

Если у Вас появятся любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого препарата, просим обратиться к Вашему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как все лекарственные средства, Фуроталгин может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они не проявляются у каждого.

Возможны аллергические реакции, которые выражаются в раздражении или покраснении слухового прохода.

При попадании в барабанную полость, хотя и редко, наблюдаются следующие побочные действия (поражают от 1 до 10 из 1000 потребителей): быстро переходящее головокружение, головная боль и снижение слуха по отношению высоких частот, тошнота, рвота.

Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

5. ХРАНЕНИЕ ФУРОТАЛГИН

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

ФАРМА АД • БЪЛГАРИЯ

SCIENTIFIC CENTRE FOR DRUGS AND MEDICAL TECHNOLOGY
EXPERTISE AFTER ACADEMIC EMIL GABRIELIAN, PhD

Expert 1: *[Signature]*

Expert 2: _____

Date: 11.03.16

Applicant: *[Signature]*

Date: 11.03.2016

Не используйте Фуроталгин после истечения срока годности, отмеченного на упаковке. Можете применять Фуроталгин до 1 месяца после вскрытия флакона.

Лекарства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите у Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Фуроталгин

- Активные составные части: нитрофурал (*nitrofurural*) 2,5 мг, тетракаина гидрохлорид (*tetracaine hydrochloride*) 31,25 мг, феназон (*phenazone*) 87,5 мг в 1 мл раствора (27 капель).
- Другая составная часть - глицерол.

Как выглядит Фуроталгин и что содержится в упаковке

Прозрачная, желтая, с зеленоватым оттенком жидкость, без запаха.

Первичная упаковка

По 5 мл препарата дозируют в круглые флаконы из коричневого стекла. Флаконы укупоривают навинчивающимися колпачками с капельницей.

По 5 мл препарата дозируют в круглые флаконы из полипропилена. Флаконы снабжены капельницей из полиэтилена и укупориваются колпачками типа "Пильферпруф" из полиэтилена.

Вторичная упаковка – 1 (один) флакон, вместе с аннотацией-вкладышем с инструкцией по применению препарата в отдельной картонной пачке.

Условия отпуска

По рецепту.

Владелец разрешения к употреблению и производитель

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Место производства

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего пресмотра листка-вкладыша

Январь, 2015 г.

SCIENTIFIC CENTRE OF DRUG AND MEDICAL TECHNOLOGY
EXPERTISE AFTER ACADEMIC EMIL GABRIELIAN JSC

Expert: *[Signature]*

Date: 11.03.16

Applicant: *[Signature]*

Date: 11.03.2016

