

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ИХТИОЛ**

Регистрационный номер

Торговое название препарата

Ихтиол

Международное непатентованное название

Ихтаммол (Ichthammol)

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Описание

Мазь тёмно-бурого цвета с запахом ихтиола.

Состав

В 100 г 10% мази содержит активное вещество - ихтаммол (ихтиол) 10.0 г, вспомогательное вещество – вазелина 90.0 г.

В 100 г 20% мази содержит активное вещество - ихтаммол (ихтиол) 20.0 г, вспомогательное вещество – вазелина 80.0 г.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство для местного применения

Код ATX

D10BX01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает противомикробное (бактерицидное в отношении грамположительных микроорганизмов - *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes* и дрожжеподобных грибков), кератопластическое действие. Ускоряет созревание фурункулов.

13.01.16
14.01.16

При непосредственном действии на кожу вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся снижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул.

Фармакокинетика

Системная абсорбция низкая.

Показания к применению

Рожа, экзема, пиодермия (в т.ч. фурункулез), стационарная и регрессирующая стадии псориаза.

Способ применения и режим дозирования

Наружно. Взрослым и детям с 12 лет наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. При необходимости используют повязку.

Продолжительность курса и особенности схемы лечения (и у детей, и у взрослых) необходимо согласовать с врачом.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к препарату,
- детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно только в том случае, если польза для матери превышает риск для ребенка или плода.

Перед применением препарата во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

При применении препарата возможны местные аллергические реакции. В таких случаях применение мази следует прекратить.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Ихтиол при его местном применении в форме мази сообщений не было.

Особые указания и меры предосторожности

Препарат предназначен только для наружного применения. Не рекомендуется наносить мазь на открытые раны.

Не следует допускать попадания препарата на слизистые оболочки рта, глаз. После нанесения мази тщательно вымыть руки для предотвращения попадания мази в глаза, нос, рот.

Препарат не рекомендуется применять у детей младше 12 лет, поскольку опыт его применения у данной группы пациентов ограничен, польза сомнительна.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами
Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Ареф
13.02.16
М.Г.
14.01.16

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает эффект других фотозащитных средств (фенилсалицилата, ПАБК и диоксометилтетрагидропирамидина), однако, фармацевтически несовместим с оксидом цинка (образует осадок), поэтому при фотозащитной терапии не должен применяться совместно с кремами и мазями содержащими оксид цинка.

Диметилсульфоксид, спирт этиловый и глицерин при одновременной аппликации с мазью ихтиоловой усиливают системную абсорбцию ихтиола и увеличивают его глубину проникновения в мягкие ткани в зоне аппликации.

Упаковка

По 25 г в тубы алюминиевые помещенных в пачку из картона вместе с инструкцией по применению

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Срок годности

4 года.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО "ЭСКО-ФАРМ"

Республика Армения, Ереван, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13
Тел.: (+37410) 673929; e-mail: escopharm@yahoo.com

Держатель регистрационного сертификата

ООО "ЭСКО-ФАРМ"

Республика Армения, Ереван, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13
Тел.: (+37410) 673929; e-mail: escopharm@yahoo.com

Дата последнего пересмотра документации

29.12.2015

Арс
13.02.16
М.Г.