

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для лечения заболеваний печени. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое и гипогликемическое действие. Тормозит формирование соединительной ткани в печени. Регулирует проницаемость биомембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая физиологическую норму процессов окислительного фосфорилирования в клеточном метаболизме. Восстанавливает мембраны гепатоцитов путём структурной регенерации и методом конкурентного ингибирования перекисных процессов. Ненасыщенные жирные кислоты, встраиваясь в биомембраны, принимают на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов печени, нормализуют функцию печени, повышают её дезинтоксикационную способность.

Различные виды эссенциальных фосфолипидов в составе Эсливер Форте® являются готовыми структурными элементами для клеток печени, восстанавливают мембраны и функциональную активность гепатоцитов. Комбинация витаминов способствует нормализации обменных процессов в организме.

Показания к применению

В составе комбинированной терапии:

- жировая дистрофия печени различной этиологии, нарушения липидного обмена печени;
- гепатит, цирроз печени;
- токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные);
- лучевая болезнь;
- псориаз.

APPROVED BY SCDBMT 1901

EXPERT/DATA_ *SR/18.01.17*

Противопоказания

APPLICANT/DIT: *Forreval 21.02.17*

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью возможно применение при беременности, в период лактации.

Особые предупреждения и меры предосторожности

Краситель азорубин (краситель кармазин), краситель солнечный закат жёлтый, краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый жёлтый, краситель пунцовый [Понсо-4R] могут вызывать аллергические реакции. Метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия могут вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные.

Способ применения и дозы

Внутрь во время еды, проглатывая целиком с достаточным количеством воды.

Взрослым - по 2 капсулы 2-3 раза в день.

Детям с 12 до 18 лет – по 1 капсуле 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения составляет 3 месяца, при продлении курса лечения необходима консультация врача.

При псориазе в течение 2 недель по 2 капсулы 3 раза в день.

Побочное действие

Аллергические реакции, чувство дискомфорта в эпигастральной области.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Эсливер Форте® не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Форма выпуска

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

APPROVED BY SCIENT

EXPERT/DATA_ *DL/18.01.17*

APPLICANT/DIT: *Зорчеват 21.02.17г.*

Производитель

«Наброс Фарма Прайвит Лимитед»

Участок номер 110/A/2 Амит Фарм, Джайн Упадхрия, N.H. номер 8

Каджипура – 387411, Кхеда, Индия

Тел.: 91-79-26405299

Факс: 91-79-26407399

Расфасовано и/или упаковано

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

APPROVED BY S

EXPERT/DATA_ *dh/18.01.17*

APPLICANT/DAT *Корнев иф 21.02.17г.*