

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Арлеверт 20 мг/40 мг таблетки  
циннаризин/дименгидринат

Перед началом приема данного лекарственного средства внимательно прочтите весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас появятся любые дополнительные вопросы, обращайтесь к своему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Данный лекарственный препарат прописан только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к своему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

### Содержание листка-вкладыша:

1. Что представляет собой препарат Арлеверт и для чего он используется
2. О чем следует знать перед приемом препарата Арлеверт
3. Как принимать препарат Арлеверт
4. Возможные побочные действия
5. Условия хранения препарата Арлеверт
6. Содержимое упаковки и прочая информация

### 1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ АРЛЕВЕРТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

В состав препарата Арлеверт входят два действующих компонента: циннаризин и дименгидринат. Эти вещества относятся к разным классам лекарственных средств. Циннаризин принадлежит к классу антагонистов кальция, а дименгидринат – к классу антигистаминных средств.

Действие каждого из этих веществ направлено на ослабление симптомов головокружения (ощущение дурноты или «вращения») и тошноты (ощущение приближения рвоты). В случае приема этих веществ в комбинации друг с другом суммарный эффект превышает эффективность каждого из них по отдельности.

Арлеверт принимают для лечения при разных типах головокружения у взрослых. Головокружение может вызываться разными причинами. Арлеверт поможет Вам справляться с повседневными обязанностями, выполнению которых мешает головокружение.

### 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА АРЛЕВЕРТ

Препарат Арлеверт нельзя принимать, если:

- Вы моложе 18 лет;
- у Вас аллергия на циннаризин, дименгидринат или дифенилдигидрамин, либо на другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6);
- у Вас аллергия на другие антигистаминные средства (например, на астемизол, хлорфенирамин или терфенадин, которые применяются в качестве противоаллергических средств). Вы не должны принимать данный препарат, если он не был назначен Вам врачом;
- у Вас закрытоугольная глаукома (определенное заболевание глаз);
- Вы страдаете эпилепсией;
- у Вас повышено внутричерепное давление (например, из-за опухоли);
- Вы страдаете алкоголизмом;
- у Вас нарушения со стороны простаты, вследствие чего затруднено мочеиспускание;
- у Вас печеночная или почечная недостаточность.

28.05.2016

### Предупреждения и меры предосторожности

Перед приемом препарата Арлеверт обратитесь за консультацией к врачу, работнику аптеки, или медицинской сестре, если у Вас имеет место:

- низкое или высокое артериальное давление;
- повышенное внутриглазное давление;
- непроходимость кишечника;
- увеличение простаты;
- повышение функции щитовидной железы;
- тяжелое заболевание сердца;
- болезнь Паркинсона.

Прием Арлеверта может усугубить данные заболевания или состояния. Тем не менее, даже при наличии этих заболеваний или состояний Арлеверт можно принимать, если врач примет их во внимание.

### Другие лекарственные средства и Арлеверт

Если Вы в настоящее время принимаете, принимали в недавнем прошлом или могли принимать любые другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу или работнику аптеки.

Арлеверт может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, которые Вы принимаете.

Арлеверт может вызывать усталость или сонливость в случае его приема со следующими лекарственными средствами:

- барбитураты (препараты, часто применяемые в качестве успокоительных средств);
- наркотические анальгетики типа морфина (сильные обезболивающие типа морфина);
- транквилизаторы (препараты, применяемые для лечения при депрессии и тревожных состояниях);
- ингибиторы моноаминоксидазы (препараты, применяемые для лечения при депрессии и тревожных состояниях).

Арлеверт может усиливать действие следующих лекарственных средств:

- трициклические антидепрессанты (препараты, применяемые для лечения при депрессии и тревожных состояниях);
- атропин (препарат, расслабляющий мышцы и часто применяемый для исследования глаз);
- эфедрин (может применяться для лечения при кашле или при заложенности носа);
- прокарбазин (препарат, применяемый для лечения при некоторых видах рака);
- препараты, применяемые для снижения артериального давления.

Аминогликозиды (класс антибиотиков) могут вызывать повреждения внутреннего уха. Однако если Вы принимаете Арлеверт, это повреждающее воздействие может остаться для Вас незамеченным.

Вам не следует принимать Арлеверт вместе с препаратами, используемыми для устранения нарушений сердечного ритма (антиаритмические средства).


Кроме того, прием препарата Арлеверт может изменять реакцию кожи на аллергические пробы.

### Прием препарата Арлеверт с едой, напитками и алкоголем

Арлеверт может вызывать диспепсию (несварение желудка), выраженность которой можно уменьшить за счет приема таблеток после еды. Принимая Арлеверт, воздержитесь от употребления алкоголя, так как он может вызывать усталость или сонливость.

### Беременность, кормление грудью и детородная функция

В случае беременности или кормления грудью, а также при вероятной или планируемой беременности перед приемом данного препарата обращайтесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

25.05.16 

27.05.16

**Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов**

Арлеверт может вызывать сонливость. В этом случае Вам не следует управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

### 3. КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТ АРЛЕВЕРТ

Данное лекарственное средство всегда принимайте в соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. Если Вы в чем-то не уверены, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

Рекомендованная доза: по одной таблетке 3 раза в сутки после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Проглатывайте таблетку целиком, не разжевывая.

Обычно рекомендуется принимать Арлеверт в течение не более 4 недель. Если Вам требуется принимать Арлеверт дольше, врач сообщит Вам об этом.

#### **Что делать в случае передозировки препарата Арлеверт**

В случае если Вы случайно приняли слишком много таблеток, либо если таблетки проглотил ребенок, Вы должны немедленно обратиться к врачу.

Если Вы приняли слишком большое количество препарата Арлеверт, Вы можете почувствовать усталость, головокружение или дрожь. Могут иметь место расширение зрачков и нарушение мочеиспускания. Могут появиться сухость во рту, покраснение лица и повышение частоты сердечных сокращений, а также потливость и головная боль.

В случае приема препарата Арлеверт в очень большом количестве возможны припадки, галлюцинации, повышение артериального давления, дрожь, повышенная возбудимость, затруднение дыхания. Может наступить кома.

#### **Что делать, если Вы забыли принять Арлеверт**

В случае если Вы забыли в очередной раз принять препарат Арлеверт, просто пропустите эту таблетку. В назначенное время примите следующую положенную дозу. Не принимайте препарат в двойной дозе для компенсации пропущенного приема.

#### **Что делать, если Вы прекратили принимать Арлеверт**

Не прекращайте принимать Арлеверт, пока Вам не скажет об этом врач. Если Вы прекратите принимать препарат раньше времени, симптомы головокружения (дурнота и ощущения «вращения») могут вновь к Вам вернуться.

Если у Вас появятся вопросы касательно применения данного лекарственного средства, обратитесь к врачу, работнику аптеки или к медицинской сестре.

### 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и у всех лекарств, у этого лекарственного средства также есть побочные действия, хотя развиваются они не у каждого.

**Побочные действия, возникающие часто (могут наблюдаться у 1 из 10 пациентов):** сонливость, сухость во рту, головная боль и боль в животе. Обычно эти явления протекают в легкой форме и прекращаются через несколько дней, даже если Вы продолжаете принимать Арлеверт.

27.05.2016

**Побочные действия, возникающие иногда** (могут наблюдаться у 1 из 100 пациентов): потливость, покраснение кожи, диспепсия, тошнота (ощущение приближения рвоты), понос, нервозность, судороги, забывчивость, шум или звон в ушах, парестезия (покалывание в кистях или ступнях), тремор (дрожь).

**Побочные действия, возникающие редко** (могут наблюдаться у 1 из 1000 пациентов): нарушения зрения, аллергические реакции (например, кожные реакции), повышенная чувствительность к солнечному свету и затруднение мочеиспускания.

**Побочные действия, возникающие очень редко** (могут наблюдаться у 1 из 10000 пациентов): снижение числа лейкоцитов и тромбоцитов, а также значительное уменьшение количества красных кровяных клеток может привести к слабости и появлению синяков, а также к повышению риска инфекции. При появлении инфекции с лихорадкой и значительном ухудшении общего самочувствия обратитесь к своему врачу и сообщите ему о том, что Вы принимаете данный препарат. При появлении инфекции с лихорадкой и значительном ухудшении общего состояния, обратитесь к своему врачу и сообщите ему о том, что Вы принимаете данный препарат.

На фоне применения препаратов данного типа могут возникать и такие реакции (на основании имеющихся данных оценке не поддаются), как: увеличение массы тела, запор, стеснение в груди, желтуха (пожелтение кожи или белков глаз, вызываемое нарушением функции печени или крови), усугубление закрытоугольной глаукомы (болезни глаз, при которой увеличивается внутриглазное давление), неконтролируемые движения, необычное возбуждение и беспокойство (особенно у детей), тяжелые кожные реакции.

#### Сообщения о побочных действиях

При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к своему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

### 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АРЛЕВЕРТ

Данное лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте данный препарат после окончания срока хранения, указанного на блистере и на картонной упаковке после слов «годен до». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Данное лекарственное средство должно храниться в оригинальной упаковке. Больше никаких особых условий для хранения данного лекарственного средства не требуется.

Никакие лекарственные препараты не выбрасывайте в канализацию или с бытовым мусором. Проконсультируйтесь с работником аптеки в отношении того, как утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

### 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Компоненты препарата Арлеверт

- Действующими веществами являются: циннаризин 20 мг и дименгидриат 40 мг.
- Вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, тальк, гипромеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, манния стеарат и кроскармеллоза натрия.

27.05.16

**Описание и форма выпуска препарата Арлеверт**

Препарат Арлеверт представляет собой круглые, белые таблетки с маркировкой «А». Они выпускаются в упаковках по 20, 50 или 100 таблеток. В продаже могут иметься упаковки не всех размеров.

**Владелец регистрационного удостоверения и производитель**

**Владелец регистрационного удостоверения:**

Менарини Интернэшнл Оперейшнз Люксембург С.А., 1, Авеню де ла Гар, 1611 Люксембург, Люксембург

**Производитель:**

Хенниг Арцнайmittel ГмбХ & Ко КГ, Либигштрассе 1-2, 65439 Флёрсхайм-на-Майне, Германия

**Уполномоченный представитель:**

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ, (МЕНАРИНИ ГРУПП), Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, Германия

Дата последней редакции данного листка-вкладыша: 03.2014 г.

ATOPHYSE AFTER ACADEMIC EMIL DAB  
Date: 16.05.16  
Date: 27.05.16