

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ДЕПАНТОЛ®

Регистрационный номер

Торговое название препарата Депантол®

Международное непатентованное или группировочное название

Декспантенол+Хлоргексидин

Лекарственная форма суппозитории вагинальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

действующие вещества: декспантенол - 100 мг, хлоргексидина биглюконат - 16 мг (в виде хлоргексидина биглюконата раствора 20 % - 85,2 мг);

вспомогательные вещества: смесь макроголов (макрогол 400 - 2 %, макрогол 1500 - 98%) - 2814,8 мг.

Описание

Суппозитории белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы с воронкообразным углублением. Допускается мраморность.

Фармакотерапевтическая группа

Стимулятор репарации тканей.

Код АТХ: G01AX.

Фармакологические свойства

Депантол® - комбинированный препарат для местного применения, оказывающий регенерирующее, антисептическое, метаболическое действие. Хлоргексидин, входящий в состав препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*; дрожжи, дерматофиты, простейшие (*Trichomonas vaginalis*). К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Декспантенол, входящий в состав препарата, стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Депантол® не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

Показания к применению

Лечение острых и хронических вагинитов; эндо/экзоцервицитов, в том числе осложненных эктопией шейки матки.

Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии).

Препарат применяется для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки

матки после деструктирующих методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации

Депантол® разрешен к применению в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, зуд, жжение, проходящие после отмены препарата.

Особые указания

Депантол® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные 100 мг+16 мг. 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород,
ГСП-459, ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru