

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ОЛЕСТЕЗИН-АВ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Олестезин-АВ

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий

Активные компоненты:

облепихового масла концентрат (с содержанием суммы каротиноидов в пересчете на β -каротин 300 мг%) – 330 мг, сульфаэтидол (этазол-натрий) – 50 мг, бензокаин (анестезин) – 100 мг.

Вспомогательные вещества:

полисорбат 80 (твин 80) – 40 мг, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) – 60 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) – 980 мг, макрогол 4000 (полиэтиленоксид 4000) – достаточное количество для получения суппозитория массой 2,35 г.

Описание: суппозитории от темно-оранжевого до красновато-коричневого цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя.

Код АТХ: С05АХ

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат обладает местноанестезирующим, противовоспалительным и антисептическим действием; способствует регенерации тканей при трещинах и эрозиях заднего прохода; оказывает кровоостанавливающее действие; снимает боль и уменьшает дискомфорт; ликвидирует воспаление и восстанавливает упругость капилляров, что обеспечивает уменьшение внутренних и наружных геморроидальных узлов.

Показания к применению

Геморрой, трещины заднего прохода, анальный зуд.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Ректально после гигиенических процедур – по 1 суппозиторию 2 раза в сутки. При необходимости – по 2-3 суппозитория 2 раза в сутки. Курс лечения – 5-7 дней (не более 10 дней).

Побочное действие

Аллергические реакции, послабление стула.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Применение в период беременности или кормления грудью

До сих пор не зарегистрирована информация о любом неблагоприятном влиянии препарата при лечении в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Информация о неблагоприятном влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не зарегистрирована.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные. По 5 штук в контурную ячейковую упаковку. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель/ организация, принимающая претензии по качеству

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-943, 326-946 Факс: (3854) 327-153, 327-640