

# Трибукс

*Trimebutini maleas*

Таблетки, 100 мг

**Одна таблетка содержит:** 100 мг тримебутина малеата.

**Вспомогательные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, моногидрат лактозы, повидон, кросповидон, магния стеарат.

**Фармакотерапевтическая группа:** лекарства, применяемые при функциональных расстройствах кишечника, синтетические антихолинергические лекарства, сложные эфиры с третичной аминовой группой.

**Код АТС:** А 03 АА 05

**Ответственный субъект и производитель**

**BIOFARM**, 60-198 Познань, ул. Валбжиска 13, Польша.

**Показания к применению лекарства Трибукс**

Лекарство Трибукс применяется при лечении:

- расстройств моторики желудочно-кишечного тракта, определяемых как синдром раздраженной кишки,
- функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта: диарея, запоры, боли живота, спастические состояния кишечника.

**Противопоказания**

Аллергии на тримебутин или какой-либо другой компонент лекарства.

**Меры предосторожности при приеме**

Не рекомендуется применять лекарство Трибукс детям в возрасте до 12 лет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Следует сообщить врачу обо всех принимаемых в последнее время лекарствах, даже тех, которые выдаются без рецепта, а особенно о лекарствах, указанных ниже.

- зотепин (психотропный препарат)
- d-тубокурарина (спазмолитик, применяемый при общем обезболивании)

**Особые указания**

**Беременность**

Исследования на животных не показали какого-либо тератогенного воздействия. Отсутствуют достаточные данные, которые бы позволили оценить влияние тримебутина, применяемого во время беременности, на возникновение врождённых аномалий или токсического воздействия на плод.

Поэтому, с целью предосторожности, не рекомендуется принимать препарат Трибукс в первом триместре беременности. Не предполагается возникновения вредного воздействия на организм матери и ребёнка, однако применение тримебутина во II и III триместрах беременности возможно только в случае крайней необходимости.

## **Кормление грудью**

Кормление грудью возможно во время лечения тримебутином после консультации с врачом.

## **Вождение транспортных средств и обслуживание машин**

Лекарство Трибукс, принимаемое в соответствии с рекомендуемой дозировкой не влияет на способность вождения транспортных средств, обслуживание машин и не снижает психофизической активности.

## **Важная информация о некоторых составных частях лекарства Трибукс**

Препарат содержит лактозу. Если у пациента обнаружена непереносимость некоторых сахаров, перед применением Трибукса необходимо обратиться к врачу.

## **Как принимать Трибукс**

Взрослые: 100 мг тримебутина малеината (1 таблетка) 3 раза в сутки.

В исключительных случаях дозу можно увеличить до 6 таблеток по 100 мг в сутки в поделенных дозах.

Дети в возрасте старше 12 лет: Трибукс можно применять у детей в дозах, не превышающих 6 мг/кг массы тела.

Препарат необходимо принимать перед едой. Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая стаканом кипяченой воды.

## **При передозировке**

В случае приёма большей дозы лекарства, чем рекомендуемая необходимо срочно обратиться к врачу или в ближайшую больницу.

## **При пропуске дозы**

Надо принять очередную дозу лекарства в назначенное время.

Не следует применять двойную дозу для восполнения пропущенной дозы.

В случае сомнений, связанных с приёмом лекарства, необходимо обратиться к врачу или фармацевту.

## **Возможные побочные действия**

Как и каждое лекарство, препарат Трибукс может вызывать побочные действия, хотя не у каждого пациента они появляются.

Принята следующая классификация частоты появления побочных реакций:

Часто (более чем 1 на 100 пациентов): ксеростомия, нарушение вкуса, диарея, расстройство пищеварения, желудочная боль, тошнота, запоры, сонливость, головокружения, головные боли, чувство тепла/холода, кожная сыпь.

Очень редко (менее чем 1 на 10 000 пациентов): расстройство менструации, болезненное увеличение груди, беспокойство, ишурия и ослабление слуха.

Если усилится какой-либо из описанных симптомов побочного действия или появится какой-либо симптом побочного действия, не указанный в листке-вкладыше, необходимо проинформировать об этом врача или фармацевта.

## **Условия отпуска**

Препарат отпускается по рецепту.

### **Хранение лекарства Трибукс**

Препарат хранить в недоступном для детей, сухом месте, при комнатной температуре т.е. 15°C-25°C.

Не следует принимать лекарство Трибукс после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности - 3 года.

### **Упаковка**

Таблетки в блистерах из плёнки ПВХ/ПЭ/ПВДХ/Ал по 10 таблеток. Картонная коробочка, содержащая 2, 3 или 6 блистеров по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем.