

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АНАУРАН®

(ANAUARAN)

Регистрационный номер:

Торговое название: АНАУРАН®

Лекарственная форма: капли ушные

Состав на 100 мл:

Активные вещества: полимиксина В сульфат - 1000000 МЕ, неомицина сульфат - 0,5 г (эквивалентно 375000 МЕ), лидокаина гидрохлорид - 4,0 г;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0,01 г, пропиленгликоль - 44 мл, глицерол - 26,5 г, вода очищенная - до 100 мл.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость без запаха

Фармакологическая группа: антибиотик комбинированный (антибиотики: аминогликозид + циклический полипептид+местноанестезирующее средство)

Код АТХ: S02

Фармакологические свойства

Комбинированное средство для местного применения, оказывает антибактериальное и местноанестезирующее действие.

Фармакодинамика

Неомицина сульфат - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия, действует бактерицидно в отношении грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae spp.*, *Shigella flexneri spp.*, *Shigella boydii spp.*, *Shigella sonnei spp.*, *Proteus spp.*) микроорганизмов; в отношении

Streptococcus spp. - малоактивен. Полимиксин В - полипептидный антибиотик. Активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae* spp., *Shigella flexneri* spp., *Shigella boydii* spp., *Shigella sonnei* spp., *Salmonella typhi* и *Salmonella paratyphi*; *Pseudomonas aeruginosa*. Не активен в отношении *Proteus* spp., *Mycobacterium* spp., грамположительных кокков, грибов. Оказывает слабое местнораздражающее действие. Лидокаин - местноанестезирующее средство, быстро устраняет боль и зуд.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились, т.к. препарат предназначен для местного применения и системные эффекты маловероятны.

Показания к применению

Острый и хронический наружный отит, средний острый отит на стадии до перфорации, хронический экссудативный средний отит; послеоперационные гнойные осложнения после радикальной мастоидэктомии, тимпаноластики, антротомии, фенестрации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

В период беременности и лактации, а также у детей до 1 года препарат следует применять только в случае крайней необходимости и под контролем врача.

Способ применения и дозы

Местно, в наружный слуховой проход с помощью специальной пипетки. После закапывания несколько минут держать голову наклоненной.

Взрослым: по 4-5 капель 2-4 раза в сутки, детям: по 2-3 капли 3-4 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания.

Курс лечения не должен превышать 7 дней.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения, после отмены препарата. Системные эффекты маловероятны вследствие низких доз используемого препарата. Однако, при длительном лечении возможно появление системных эффектов, в частности, ототоксичности и нефротоксичности вследствие всасывания неомицина.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Несовместим с мономицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином, нетилмицином (возможно усиление ототоксического действия вышеперечисленных антибиотиков).

Передозировка

В литературе не описаны случаи передозировки.

Особые указания

Анауран применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.

Длительное применение Анаурана, как и других антибиотиков, может привести к развитию суперинфекции резистентными к препарату микроорганизмами.

Форма выпуска

Капли ушные.

По 25 мл во флакон темного стекла с крышечкой-капельницей из полиэтилена с контролем первого вскрытия.

По одному флакону с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре от 15°C до 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

Срок годности – 3 года.

После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 3 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускают по рецепту врача.

Предприятие-производитель и адрес

Замбон С.П.А.,

36100, Виа делла Кимика, 9, Виченца, Италия.

Адрес представительства в России

119002 Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17

Тел.: (495) 933-38-30

Факс: (495) 933-38-31

Руководитель отдела регистрации



Кокорникова О.Ф.