

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХОФИТОЛ (СНОРНУТОЛ)

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ХОФИТОЛ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: раствор для приема внутрь

СОСТАВ НА 100 МЛ

Активный компонент:

Артишока полевого (*Cynara Scolymus* L) листьев свежих густой водный экстракт.....20г

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый, ароматизатор апельсиновый, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная.

ОПИСАНИЕ

Темно-коричневый непрозрачный раствор с легким зеленоватым осадком.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Желчегонное средство растительного происхождения.

КОД АТХ: A05AX

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом входящих в состав полевого артишока биологически активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолкислотами обладает желчегонным, а также гепатопротекторным действием. Содержащиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, витамины B1 и B2, инулин способствуют нормализации обменных процессов. Хофитол увеличивает диурез и усиливает выделение мочевины.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИЕМУ

Традиционно используется для повышения выделительной функции почек и пищеварительного тракта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчекаменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей.

Детский возраст до 12 лет.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Безопасность при беременности и грудном вскармливании не установлена. В связи с отсутствием соответствующих данных, применение при беременности и грудном вскармливании не рекомендуется.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И РАБОТУ С МЕХАНИЗМАМИ

В связи с содержанием в препарате алкоголя, следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и реакции (управление транспортными средствами, работа с механизмами и т.п.)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Взрослым: по 2.5-5.0 мл раствора перорально 3 раза в сутки, до еды.

Курс лечения 2-3 недели.

Детям старше 12 лет: в дозе, составляющей от ¼ до ½ дозы, применяемой у взрослых.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

ПЕРЕДЪИЗИРОВАНИЕ

Возможно усиление проявлений побочного действия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта (0.13г в чайной ложке): лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия): дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф (антибактериальные средства – цефалоспорины), хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид (антидиабетические

EXPERT/DATA...
P. 4. 5. 17
22.05.17
P. 1

средства, производные сульфонилмочевины), гризеофульвин (противогрибковое средство), производные нитро-5-имидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетокеназол, прокарбазин (цитостатическое средство); а также лекарственные средства, угнетающие функцию центральной нервной системы.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Одна чайная ложка раствора содержит 0,13 г этилового спирта. Необходимо избегать приема алкогольных напитков. Из-за содержания этилового спирта необходимо соблюдать осторожность пациентам с алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговыми травмами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для приема внутрь. По 120мл в стеклянном флаконе желто-коричневого стекла, с пластмассовой навинчиваемой крышкой с контролем вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Произведено:

Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA
68, rue Jean-Jacques Rousseau
75001, Paris, France

Держатель регистрационного сертификата

Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA
68, rue Jean-Jacques Rousseau
75001, Paris, France

APPROUVE POUR L'USAGE
EXPERT/DATA. *Pebarzds 17.05.17*
22.05.17
SMI