

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
Государственного контроля
лекарственных средств и
медицинской техники
В.Е.Акимочкин
25 августа 2003 г

ОДОБРЕНО
Фармакологическим
Комитетом МЗ РФ
30 мая 2002 г
Пр. № 1

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
САМПРОСТ

Регистрационный номер: P N001849/02

Торговое наименование: Сампрост

Группировочное наименование: простаты экстракт

Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Состав:

1 флакон содержит 5 мг лиофилизата (препарата полипептидной природы, получаемого путем экстракции ткани простаты быков и бычков, достигших половой зрелости) и 10 мг глицина.

Описание.

Лиофилизированная масса в виде таблетки, комочков или порошка, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа.

Средство для лечения хронического простатита.

Код АТС: G04BX

Фармакологическое действие

Способствует уменьшению отека, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает количество лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря.

Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью.

Показания к применению

Сампрост применяют у взрослых для лечения хронического простатита и осложнений после операций на предстательной железе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно по 5-10 мг один раз в сутки в течение 5 - 10 дней.

Перед введением препарат растворяют в 1 мл 0,25-0,5 % раствора прокаина, раствора натрия хлорида 0,9 % или воды для инъекций. При необходимости проводят повторный курс (через 1 - 6 месяцев).

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не отмечено какого-либо отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 5мг.

По 5 мг действующего вещества во флаконы стеклянные вместимостью 5 мл, укупоренные пробками резиновыми медицинскими, обкатанные колпачками алюминиевыми.

По 10 флаконов вместе вкладышем из пленки ПВХ и с инструкцией по медицинскому применению препарата в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Производитель

ООО «Самсон-Мед»

196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13

Тел.: (812) 326-36-44, факс (812) 702-45-91