

Контрактубекс

(Contractubex)



Торговое название: Контрактубекс

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Состав:

1 г геля содержит:

Активные вещества:

Жидкий экстракт луковиц Allium сера (1,75:1)	100 мг
экстрагент: этанол/вода (1:6)	
Гепарин натрия	50 ME
Аллантоин	10 мг

Вспомогательные вещества:

Сорбиновая кислота (E200)
Метилпарагидроксибензоат (E218)
Ксантановая паста (E415)
Полиэтиленгликоль 200 (E1521)
Эфирное масло (аромат 231616)
Вода очищенная

Описание: непрозрачный, от светло-бежевого до светло-коричневатого цвета гель с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: прочие ранозаживляющие средства, код АТС: D03AX.

Фармакологические свойства:

Препарат оказывает антипролиферативное, противовоспалительное и размягчающее действие на рубцовую ткань.

Показания к применению

- Гипертрофические, келоидные, ограничивающие движение рубцы, возникающие после хирургических операций, ампутаций, ожогов и травм.
 - Контрактуры (травматические сухожильные контрактуры, контрактура Дюпюитрена,)
 - Рубцовые стриктуры (атрофические рубцы)
- Контрактубекс применяется только после заживления раны.

Способ применения и дозировка

Наносить 2-3 раза в сутки необходимое количество геля и осторожно втирать в рубец до полного впитывания. При плотных рубцах можно оставить гель под повязкой на ночь.

В зависимости от размера и толщины рубца лечение длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Необходимо избегать физического раздражения (например, сильного холодового воздействия, ультрафиолетового облучения или чрезмерного массажа), особенно при лечении свежих рубцов.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные о безопасности применения во время беременности и в период лактации отсутствуют. Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

Лекарственное средство не рекомендовано для применения женщинам во время беременности и кормления грудью.

Применение в педиатрии

Данные о применении лекарственного средства в педиатрической практике ограничены, данные о применении у детей до 1 года отсутствуют. Применение лекарственного средства у детей до 1 года противопоказано. Применение лекарственного средства у детей старше 1 года возможно только после консультации врача в случае, если польза от применения превышает возможный риск, во время лечения необходимо наблюдение врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам (экстракт лука, гепарин натрия или аллантаин), а также вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.

Побочное действие

Частота возможных побочных эффектов, перечисленных ниже, определяется согласно следующей шкалы: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$ до $<1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$ до $<1/100$), редко ($\geq 1/10000$ до $<1/1000$), очень редко ($<1/10000$), не известно (не может быть оценена по имеющимся данным).



Инфекции и инвазии

Частота не известна: гнойничковые высыпания

Со стороны иммунной системы

Частота не известна: реакции гиперчувствительности (аллергические реакции)

Со стороны нервной системы

Частота не известна: парестезии

Со стороны кожи и подкожной ткани

Часто: зуд, эритема, телеангиэктазия, атрофия рубцов

Не часто: гиперпигментация кожи, атрофия кожи

Частота не известна: контактный дерматит, крапивница, сыпь, раздражение кожи, папулы, дерматит, жжение кожи, чувство стянутости кожи.

Общие расстройства и нарушения в месте нанесения

Частота не известна: отечность, боль в месте нанесения, шелушение в месте нанесения.

Обычно Контрактубекс переносится удовлетворительно при длительном применении. Во время применения лекарственного средства нечасто наблюдается зуд вследствие ремоделирования рубца. Прерывания терапии по этой причине обычно не требуется.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Исследования по изучению взаимодействия не проводились.

На настоящий момент сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Меры предосторожности

Перед применением лекарственного средства проконсультируйтесь с врачом.

Не наносить на открытую рану. При попадании в глаза промыть теплой водой.

Контрактубекс содержит метилпарагидроксibenзоат, который может вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные). Контрактубекс содержит сорбиновую кислоту, которая может вызвать местную кожную реакцию по типу дерматита.

Если симптомы сохраняются при применении лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортом и работать с механизмами

Исследования не проводились.

Форма выпуска

По 20,0 г геля помещают в алюминиевую трубу с завинчивающейся крышкой. По 1 трубе вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

После вскрытия трубы использовать в течение 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Предприятие-производитель

«Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА.» D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне.

