

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

НИКЛОЗАМИД
500 мг, таблетки жевательные

Никлозамид

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.

Необходимо принимать этот лекарственный препарат всегда точно в соответствии с информацией, содержащейся в данном листке-вкладыше, или по указанию своего лечащего врача или фармацевта.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно, его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Если Ваше самочувствие не улучшается или наоборот ухудшается, то обратитесь к своему врачу.
- Если у Вас изменилась тяжесть побочных эффектов или появились побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом лечащему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Никлозамид и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед применением Никлозамида
3. Как принимать Никлозамид
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Никлозамид
6. Дополнительная информация

1. Что такое Никлозамид и для чего он применяется

Никлозамид антигельминтный препарат, применяемый при заражении ленточными глистами такими как:

Taenia saginata (Бычий цепень)
Taenia solium (Свиной цепень)
Diphyllobothrium latum (Широкий лентец)
Hymenolepis nana (Карликовый цепень)

Никлозамид уничтожает кишечных глистов. Никлозамид неэффективен при внекишечных цестодозах, таких как цистицеркоз и эхинококкоз, вызываемые личинками гельминтов.

2.Что необходимо знать перед применением Никлозамида

Не принимать Никлозамид:

Если у Вас аллергия на никлозамид или на любой другой компонент препарата, перечисленный в подразделе «Что содержит Никлозамид» (см. раздел 6).

Особые указания и меры предосторожности

При склонности к запорам необходимо принимать слабительные средства для восстановления работы кишечника до начала лечения Никлозамидом.

Во время лечения Никлозамидом необходимо воздерживаться от приема алкогольных напитков.

При заражении **свиным цепнем (Taenia solium)** прием слабительных средств является **обязательным**.

Если Вы думаете, что одно из этих состояний может относиться к Вам, если у Вас возникли вопросы или сомнения относительно приема этого лекарственного препарата, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту, прежде чем принимать Никлозамид.

Другие лекарственные препараты и Никлозамид

Необходимо проинформировать врача или фармацевта, если Вы принимаете, недавно принимали или должны принимать любые другие препараты, даже если это препараты, отпускаемые без рецепта.

Прием Никлозамида с едой и напитками, включая алкоголь.

Никлозамид взаимодействует с алкоголем, поэтому прием Никлозамида несовместим с употреблением алкогольных напитков.

Беременность, кормление грудью, фертильность.

Во время беременности Никлозамид назначается только в случае крайней необходимости. Особенно не рекомендуется принимать Никлозамид в первом триместре беременности.

Не известно выделяется ли Никлозамид в грудное молоко. Никлозамид может быть назначен во время грудного вскармливания только после тщательной оценки врачом соотношения “риск/польза”.

Если Вы беременны или кормите грудью, а также при подозрении на беременность или планировании беременности, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом перед тем, как принимать этот препарат.

Вождение транспортных средств и управление механизмами

Никлозамид может оказывать влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

3. Как принимать Никлозамид

Никлозамид следует принимать в точности так, как предписано врачом. Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу приема препарата, то Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза при заражении ленточными глистами такими как: бычий цепень (*Taenia saginata*), свиной цепень (*Taenia solium*), широкий лентец (*Diphyllobothrium latum*):

Взрослые и дети старше 6 лет

4 таблетки

Дети от 2 до 6 лет

2 таблетки

Дети младше 2 лет

1 таблетка

При заражении Карликовым цепнем (*Hymenolepis nana*) рекомендуется лечение в течение 7 дней в следующей дозировке:

1 день:

<u>Взрослые и дети старше 6 лет</u>	<u>4 таблетки</u>
<u>Дети от 2 до 6 лет</u>	<u>2 таблетки</u>
<u>Дети младше 2 лет</u>	<u>1 таблетка</u>

Со 2 по 7-й день:

<u>Взрослые и дети старше 6 лет</u>	<u>2 таблетки в день</u>
<u>Дети от 2 до 6 лет</u>	<u>1 таблетка в день</u>
<u>Дети младше 2 лет</u>	<u>½ таблетки в день</u>

Суточную дозу следует принимать один раз и сразу после завтрака.

При гельминтозах возникает обильное образование кишечной слизи, которую можно устраниить с помощью приема кислых фруктовых соков.

Данное действие способствует легкому устранению паразитов, расположенных под слизистым слоем, в стенке кишечника.

Таблетки необходимо разжевать до образования кашицы и запить небольшим количеством воды. Прежде чем проглотить таблетку, Вы также можете ее растворить в небольшом количестве воды.

Детям младшего возраста рекомендуется предварительно измельчить таблетку, а затем проглотить с небольшим количеством жидкости.

Через два часа после приема препарата следует принять слабительные (например, магния сульфат или натрия сульфат), которые вызывают диарею и способствуют быстрому и полному выведению солитера из организма.

Если после приема слабительных солитер не был полностью изгнан, то в течение нескольких дней после лечения в кале будут обнаружены их фрагменты.

При продолжении лечения ни проглоттиды, ни яйца глистов не должны быть обнаружены в кале.

При повторном заражении через три месяца после лечения в кале будут обнаружены яйца бычьего цепня или свиного цепня.

При заражении карликовым цепнем (*Hymenolepis nana*) контроль эффективности лечения необходимо проводить через 14 дней.

После каждого посещения туалета необходимо мыть руки во избежание риска повторного заражения. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, как в день начала лечения, так и в последующие дни.

Если Вы приняли большие Никлозамида, чем Вам рекомендовано

Не было зарегистрировано ни одного случая передозировки препаратом Никлозамид.

Если Вы приняли слишком много таблеток Никлозамида, немедленно обратитесь к врачу или фармацевту.

Если Вы забыли принять Никлозамид:

Если Вы забыли принять очередную дозу препарата, примите ее как можно скорее и продолжайте принимать таблетки в обычном режиме.

Не следует принимать двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекращаете прием Никлозамида

Вы должны посоветоваться со своим врачом, прежде чем прекращать прием этого препарата.

Не прекращайте лечение раньше срока, так как Ваше состояние может ухудшиться

Если у Вас возникли вопросы об использовании данного препарата, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, Никлозамид может вызвать побочные эффекты, однако они возникают не у каждого пациента.

Частота возникновения перечисленных побочных реакций неизвестна. Данные получены на основании спонтанных сообщений.

- Аллергические реакции (например: покраснение кожи, зуд и сыпь кожи (экзантема)), анафилактическая реакция (реакция гиперчувствительности) и анафилактический шок.
- Головокружение (спутанность сознания)
- Синюшная окраска кожи (цианоз)
- Тошнота, рвота, абдоминальные и желудочно-кишечные боли, отрыжка, диарея.
- Сыпь, зуд, повышенная потливость (гипергидроз)
- Недомогание (усталость)

Отчетность о побочных эффектах:

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше.

Также Вы можете сообщить о побочных эффектах непосредственно в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им.академика Э.Габриеляна, переходя на сайт:

www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”.

Телефон горячей линии: +37410237665; +37498773368.

Сообщая о побочных эффектах, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности этого препарата.

5. Как хранить Никлозамид

- Не принимать Никлозамид по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
- Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом и защищенном от света месте.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Срок годности - 3 года.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

Что содержит Никлозамид?

Активное вещество: *Никлозамид – 500.0 мг в каждой таблетке;*

Другие компоненты: ксилитол, натрия крахмала гликолат, кукурузный крахмал, магния стеарат, ванилин, натрия сахарин.

Как выглядит Никлозамид и содержимое упаковки

Круглые таблетки, желтого цвета с темными вкраплениями со специфическим запахом и вкусом ванилина, с риской на одной стороне и фаской.

Описание упаковки:

4 таблетки жевательные в пластиковом флаконе вместе с листком—вкладышем помещены в картонную упаковку.

Каковы условия отпуска Никлозамида из аптек

Отпускается по рецепту.

Производитель

ООО "АРИМЕД"

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Владелец регистрационного удостоверения

ООО "АРИМЕД"

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста