

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Циннаризин Софарма 25 мг таблетки
Cinnarizine Sopharma 25 mg tablets
циннаризин (cinnarizine)

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш перед началом применения этого лекарственного препарата, так как он содержит важную для Вас информацию.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если у Вас возникли любые дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.
- Этот лекарственный препарат назначен лично Вам. Не передавайте его другим лицам. Он может навредить им, независимо от того, что признаки их заболевания такие же, как и у Вас.
- Если у Вас появится любое побочное действие, уведомите об этом Вашего врача или фармацевта. Это включает и все возможные побочные действия, не описанные в этом листке-вкладыше. Смотрите пункт 4.

В этом листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Циннаризин Софарма и для чего используется
2. Перед тем, как начнете принимать Циннаризин Софарма
3. Как принимать Циннаризин Софарма
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Циннаризин Софарма
6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦИННАРИЗИН СОФАРМА И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Циннаризин - препарат из группы лекарственных средств, называемых блокаторами кальция. Он улучшает мозговую и периферическую микроциркуляцию. Подавляет нистагм (неконтролируемые движения глаз) и другие проявления вестибулярных нарушений, уменьшает возбудимость лабиринта. Оказывает и известное антигистаминное (антиаллергическое) действие.

Используется для:

- симптоматического лечения при болезнях вестибулярного аппарата и болезни Меньера, выражающейся в головокружении, тошноте, рвоте, шуме в ушах.
- профилактики и лечения дорожной болезни.

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧНЕТЕ ПРИНИМАТЬ ЦИННАРИЗИН СОФАРМА

Не принимайте Циннаризин Софарма

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- если Вы беременны или кормите грудью;

Соблюдайте особую осторожность при применении Циннаризин Софарма

- если Вы страдаете болезнью Паркинсона или у Вас были симптомы экстрапирамидальных нарушений (дрожание, нарушения ориентации и равновесия);
- если у Вас гипотония (низкое кровяное давление);
- если у Вас заболевание желудка.

Прием других лекарственных средств

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA - U.R.V./22.02.17

APPLICANT/DATA -



M. Kostov

24.02.2017

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включительно и отпускаемые без рецепта.

- Одновременное применение препарата Циннаризин Софарма с алкоголем, лекарствами, воздействующими на центральную нервную систему (депрессанты ЦНС или трициклические антидепрессанты) вызывает взаимное усиление их эффектов.
- Ввиду своих антигистаминных эффектов циннаризин может вызвать ложные отрицательные результаты при кожных пробах на сверхчувствительность. Это обуславливает необходимость приостановления лечения циннаризином по меньшей мере за 4 дня до проведения тестов.

Прием Циннаризин Софарма с пищевыми продуктами и напитками

Не следует употреблять алкоголь во время лечения препаратом.

Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарственного препарата.

Беременность

Из-за отсутствия хорошо контролируемых клинических исследований относительно безопасности у беременных женщин, применение препарата противопоказано в период беременности.

Грудное вскармливание

Из-за отсутствия данных о проникновении в грудное молоко, его использование в период грудного вскармливания противопоказано. Если требуется применение препарата, грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с машинами

Циннаризин Софарма может вызвать сонливость, особенно в начале лечения, что требует его осторожного применения у водителей и операторов машин при точной оценке польза/риск.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществ Циннаризин Софарма

Циннаризин Софарма содержит лактозу в качестве вспомогательного вещества. Если врач сообщил Вам, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к Вашему врачу перед приемом этого лекарственного препарата.

Лекарственный препарат содержит пшеничный крахмал. Является подходящим для лиц с целиакией.

Пациенты с аллергией на пшеницу (отличающейся от целиакии) должны не принимать этот лекарственный препарат.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ЦИННАРИЗИН СОФАРМА

Всегда принимайте Циннаризин Софарма, в точности соблюдая назначения Вашего врача. Если Вы в чем-то не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Применяют взрослым и детям в возрасте от 12 лет. Таблетки принимают внутрь с достаточным количеством воды после еды.

Вестибулярные симптомы (головокружение, тошнота)

Суточная доза составляет 3 таблетки (75 мг), принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Профилактика кинетозов (болезнь движения).

Принимают по 1 таблетке за 2 часа перед отправлением в дорогу и по 1 таблетке каждые последующие 8 часов пребывания в дороге.

Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Эффективность лечения зависит от индивидуального дозового режима и достаточной продолжительности курса лечения.

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA-21.8V/22.02.17

APPLICANT/DATA-



24.02.2017
M. Karlov

Дети

Эта лекарственная форма (таблетки) является неподходящей для детей в возрасте до 12 лет.

Если Вы приняли дозу Циннаризин Софарма превышающую необходимую

Если Вы приняли очень много таблеток, немедленно обратитесь к Вашему врачу или в ближайшее лечебное учреждение.

При передозировке возможно понижение кровяного давления, появление дрожания, рвоты, сонливости.

Если Вы пропустили принять Циннаризин Софарма

Если Вы пропустили принять одну дозу, примите ее насколько возможно скорее. Если почти наступило время для следующей дозы, примите ее как обычно, пропуская забытую дозу. Не принимайте двойную дозу для компенсации забытой. Продолжайте принимать лекарственный препарат, соблюдая назначения Вашего лечащего врача.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы, связанные с использованием этого лекарственного препарата, просим обратиться к Вашему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все лекарственные средства, Циннаризин Софарма может вызвать нежелательные эффекты. Они, однако, не обязательно наблюдаются у всех пациентов, так что Вы можете и не получить никакой реакции.

Наиболее часто встречающиеся нежелательные реакции – сонливость, тошнота, увеличение веса.

Другие реже встречающиеся нежелательные реакции (нечастые): сухость во рту, гиперсомния, летаргия; дискомфорт в желудке, рвота, боль в животе, плохое пищеварение, повышенная потливость, лихеноидный кератоз, усталость, реакции сверхчувствительности.

Нежелательные реакции с неизвестной частотой: головная боль; у больных более пожилого возраста, продолжительное время принимающих циннаризин в более высоких дозах, возможно появление экстрапирамидной симптоматики (тремор, дезориентация, нарушение равновесия), включительно синдром Паркинсона, красный плоский лишай, подострая кожная красная волчанка, мышечная ригидность.

При появлении любое из нежелательных эффектов, в том числе и таких, которые не упомянуты в настоящем листке-вкладыше, немедленно обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

5. КАК ХРАНИТЬ ЦИННАРИЗИН СОФАРМА

Не требует специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 (три) года.

Не используйте Циннаризин Софарма после истечения срока годности, отмеченного на картонной упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Лекарственные препараты не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите у Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарственные препараты. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA_ 0.28/22.02.17

APPLIC/INT/DATA_

М. Колева 3
24.02.2014



Что содержит Циннаризин Софарма

- *Активное вещество:* циннаризин 25 мг в одной таблетке.
- *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат; пшеничный крахмал; повидон К 25; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный, безводный; целлюлоза микрокристаллическая (тип 101).

Как выглядит Циннаризин Софарма и что содержится в упаковке

Белые или почти белые, круглые, двояковыпуклые таблетки, диаметром 7 мм.
По 50 таблеток в блистере из твердой, оранжевой, прозрачной ПВХ пленки/алюминиевой фольги, по 1 (одному) блистеру в картонной пачке, вместе с листком-вкладышем.

Условия отпуска: по рецепту.

Владелец разрешения на применение и выпускающий серии

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Место производство:

АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последней актуализации листка-вкладыша: Июнь, 2016

APPROVED BY SCOMTE JSC
EXPERT/DATA_ U. Rv / 22.02.17
APPLICANT/DATA_

